

三ノ下



#1336609111  
v. 8



編註醫學入門

三卷下

傷寒用藥賦

百五 汗吐下滲和解溫補總方

內傷

百一 內外傷辨

百九 內傷辨

百四 脾胃虛實傳變論

百三 內傷饑飽勞倦總方







傷寒用藥賦

大陽無汗寒傷榮臘月麻黃湯為最大陽有汗風傷衛腦

月桂枝湯可先易老冲和湯即九味治風寒而發於三季

陶氏冲和湯分陰陽以救乎雙傳此方以兩感必死但陽

之中病即愈如不愈者看表裏陰陽多少用藥是以用九味羌活湯去蒼朮加柴胡乾葛石羔黑豆皆三陽經藥也

陽明之本宜解肌審葛根白虎於寒熱傷風有汗表虛者桂枝湯○傷寒無

汗表實者葛根湯○不惡寒陽明之標須承氣詳痞滿燥反惡熱二便不閉者白虎湯

實於便堅痞滿燥實俱全者大承氣湯○有痞滿而無燥實者小承氣湯○有燥實而無痞滿者調胃承

氣大柴胡湯行陽明帶表之秘小柴胡湯擅少陽和解之



權有痰妨胃滿瓜蒂散  
施肢湯 緩緩飲無頭疼身熱附子

乾姜熟熟煎

古姜附湯乾姜一兩生附一枚水三盞煎至一盞去渣頓服治直中陰經真寒症如厥逆

脈不至加  
耳草一倍  
理中湯建中湯  
治太陰中臟寒之不足桂黃桂

苓祛太陰傳臍熱之不平

桂枝加大黃湯桂枝三錢芍藥四錢甘草二錢半大黃二錢姜

五片棗二枚水煎溫服治太陰傳經熱症腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈流有力本方陶氏加枳殼柴胡臨服入攪水三匙如腹滿不惡寒而喘去甘草加太腹皮。桂枝加芍藥湯桂枝三錢芍藥四錢甘草一錢姜四片棗一枚水煎溫服治太陰腹滿痛甚或太陽病下之轉屬太陰者利溼亦宜。陶氏桂苓飲五苓散

小承氣湯

反之四逆倍甘草拒陽可愈  
四逆歌陰熱症太

承氣湯

反之四逆用當歸似瘡自痊  
當歸四逆此雖六經之



正治實具百病之真筌表裏陰陽通治

凡言表症分有汗無汗俱於前正方

內隨經選用凡言裏症分傳經直中俱於前正方內選用凡言陰症俱於前溫中熱藥內選用凡言陽症俱於前通

重寒藥內選用是數方可以代百方雖曰仲景方法猶有遺失之根據愚見於此推類而通於雜病則方法亦無以

加汗吐下溫養全

凡言宜汗即前正方中或發表或解肌矣之劑選用凡言宜吐即前正方中或探

吐或湧宜之劑選用凡言宜下即前正方中潤下湧泄之劑選用凡言宜溫即前正方中臟寒亡陽之劑選用是數

法者可以兼百法貴乎用之當耳設用麻黃令人亡陽汗出不止將病人頭髮水浸外用糯米粉并龍骨牡蠣未撲

之誤用硝黃令人不禁用理中湯加炒糯米烏梅壁土止之誤用姜附令人失血發斑用蘿蔔汁或子搗汁或泥漿

汁再入黃連甘草犀角可解其毒不然身有紅處乃血發從各竅出也

抑又聞風寒總曰汗

病麻桂不可亂嘗

不論傷風傷寒皆以得汗則散但有大汗解肌之不可亂耳

無汗服



桂枝而嘔吐失血下利者變用

傷寒無汗或酒客誤服桂枝湯而嘔吐者必吐膿血

為肺痿症又有其病當汗而適值失血及下利者不可與麻黃湯宜小劑桂枝湯頻頻飲之體潤自然和解

汗服麻黃而煩躁寒熱似瘡者相當

傷風服桂枝湯不解寒熱似瘡日再發者

乃邪客榮衛宜桂枝二麻黃一湯若非此症誤服麻黃者

必煩躁衄血衄血與上肺痿二症照依雜症以清血涼血

之劑畧加和表之藥如犀角

地黃湯黃芩湯加柴胡是也

傷寒輕者麻黃杏仁飲

前胡黃芩陳皮半夏各一錢杏仁細辛各八分防風七分

甘草四分姜三片水煎溫服治太陽發熱惡寒頭痛無汗

脈浮緊而咳嗽如夏月去麻黃加蘇葉自汗去麻黃加桂

枝芍藥表熱換柴胡口渴加天花粉胃滿加枳壳喘急加

小柴胡傷風輕者柴胡半夏湯

柴胡半夏各一錢半黃芩白朮陳皮麥門冬各一錢甘草

五分姜三片棗二枚水煎溫服治傷風發熱惡寒頭痛無

汗而咳嗽或協熱自利兼治一切瘧症狀似傷寒如小便



不利加茯苓冬月無汗加麻黃三時無汗加蘇葉冬月有汗加桂枝三時有汗加防風咽痛加桔梗喘嗽去白朮加杏仁桑白皮酒熱加黃連食積加山楂神麴痰伏脇下作痛加白芥子痰盛喉中如牽鋸加竹瀝姜汁痰稠如膠加金沸草前胡防風羌活獨活臍痞悶加枳殼大羌活湯主治陰陽兩感防已黃芩黃連

蒼朮白朮甘草細辛各三分知母川芎地黃各一錢水煎熱服未解再服三四劑病愈則止治發熱惡寒無汗或自

汗頭痛項強或傷寒見風脉傷風見寒脉兼解利兩感傷寒此方治陰陽已分陽症多者宜服陶氏中和湯為陰陽

未分者設大青龍湯善解風寒兩傷麻黃三錢桂枝二錢杏仁一錢半石羔四錢甘草一

錢姜三片棗二枚水煎溫服方意以寒宜甘發麻杏石甘

棗之甘以散榮中之寒風宜辛散桂枝生薑之辛以散衛

中之風辛甘相合乃能發散榮衛風寒風傷則衛實寒傷則榮實榮衛俱實太陽症具無汗而煩躁者宜服若脉微有汗榮衛俱虛者誤服則厥逆筋惕肉瞤而亡合病嘔而不利葛根加以半夏葛根



加半夏湯葛根三錢麻黃三錢桂枝一錢半夏芍藥各一

錢甘草八分姜三片棗二枚水煎服治太陽陽明合病裏

氣逆上但嘔而不下利者與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣

以半姜黃芩半夏生姜湯黃芩三錢芍藥生姜各一錢半陽少陽合病自利而嘔或陽痞協熱自利

非汗下所宜故用此和解以下胃之逆氣太陽併病陽明

芍麻葛硝黃看罷未太陽症未罷無汗者葛根湯有汗者氣湯胃承太陽併病少陽者麻桂柴胡要酌量無汗者小柴胡

者柴胡桂枝湯三時與輕者小柴胡湯為主仍以羌活防風代麻桂可也春夏秋冬疫癘升麻

人黃如意升麻葛根湯方意以四氣不和醫毒為疫故用升麻葛根甘草以解百毒芍藥以和中用消疫

毒更妙於敗毒散○人中黃九大黃黃連黃芩人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃各等分為末神麴糊丸梧子



大每七十九氣虛四君子湯下血虛四物湯下痰多二陳湯下熱者加童便如無入中黃用糞缸岸代之或硃砂雄黃爲衣亦好。如意丹川烏八錢檀榔人參柴胡吳茱萸川椒白芷白茯苓黃連紫苑厚木肉桂當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆二錢半擇吉日於不聞雞犬處靜室誠心修合各取淨末煉蜜爲丸梧子大硃砂爲衣每三九或五九七九專治溫疫及一切鬼祟伏尸傳毒癰疽狂失心山嵐瘴氣霍亂或白湯下風疫及宿患大風身體頭麻不知痛痒眼淚不止下睛針不安面赤舌紅日久潰眉瘡脫唇爛齒焦偏頭痛紫癰瘡癰左癰右癰鶴膝風疫一切風疾荆芥煎湯下寒疫及小腸氣痛小茴煎湯或吳萸煎湯下暑疫及五淋燈心煎湯下熱甚大黃煎湯下燥疫生地或麻子仁煎湯下或冷水下濕疫及水腫車前子或木通煎湯下十種水氣甘遂大戟煎湯下瘰癧其遂煎湯下膀胱疝氣腫疼羅蔔煎湯下五般瘡白礬湯下五癰乳香湯下腎臟積咬齒齲涎腰疼鹽湯下五瘡疥枝煎湯下失心中邪柳枝煮枝湯下陰陽二毒傷風咳嗽薄荷煎湯下五痔八痢腸風臟毒陳米煎湯下諸般咳嗽姜湯下小兒十二驚



風薄荷煎湯下丹瘤癰疽瘰癧瘡痍瘰癧喘消渴大小腸閉  
或泄或利酒毒便紅喉痺重腮誤吞銅鐵金石藥毒不服  
水土溫湯下痢疾紅甚黃連煎湯下婦人血海久冷帶下  
赤白帶為生育及諸般血氣艾湯下此方通治山物素下  
服藥之人存  
風寒暑濕邪愈藿香正氣散  
不換金正氣

藿香半夏蒼朮各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎溫  
服治四時感冒傷寒時氣溫疫山嵐瘴氣但覺四肢拘急  
心腹滿悶飲食不化或有吐利惡寒等症却未發熱者宜  
此先正胃氣以預防之兼治霍亂吐瀉下痢赤白不服水  
土等症施或身更加頭痛發熱胃滿者藿香正氣散如前  
症更加身痛者入參敗毒散九味羌活湯○藿香正氣散  
藿香紫蘇白芷大腹皮茯苓各六分厚朴白朮陳皮桔梗  
半夏夏薤各四分甘草二分姜棗煎服治內傷脾胃外感寒  
邪寒熱拘急頭痛嘔逆胃中滿悶與夫傷食傷冷傷濕中  
暑霍亂山嵐瘴氣不服水土寒熱如瘧並宜增損用之非  
正傷寒之藥若痛在大腸頭疼發熱骨節痛者此方絕無  
相干誤服反盛正氣逆其經絡凡氣虛及夾陰傷寒俱不



可用春溫通聖雙解

防風通聖散防風川芎當歸赤芍太黃

麥桔梗各五分滑石一錢半甘草一錢荆芥白朮山梔各

一分半姜三片水煎溫服治春夏溫熱狀如傷寒表裏俱

見者兼治內科一切風寒燥熱及飲酒中風或便閉或

泄或風熱上壅不言等症雜科耳目口鼻唇舌咽喉風熱

風痰等症外科癰疽瘡癤發背打撲跌傷等症小兒驚癇

積熱諸風潮搐痘出不快等症婦人諸疾合四物湯一料

凡屬風熱之疾無所不治如自利去硝黃自汗去麻黃各

通聖散○雙解散即防風通聖散合益元散等分姜葱一

鼓煎服散則探吐飲下則下欲汗則汗故名雙解散治

風寒暑濕饑飽勞役內外諸邪所傷以致氣血怫鬱變成

積熱發為汗病往來寒熱癰瘡驚悸等症小夏熱益元單

兒瘡疹尤效如自利去硝黃自汗去麻黃

方益元散又名六一散取天一生水地六成之義也滑石

六兩甘草一兩為末每三錢入蜜少許沸湯調服熱者

冷水調服孕婦慎服半產者忌服如傷寒身熱不解加蒼木

末三錢葱豉湯調連進數服汗出為度又汗吐下後餘熱



以此解之甚妙。煩煩不卧，加辰砂少許，身熱霍亂嘔吐轉筋者，先坎地坑，傾新水一桶，在內攪勻澄清，謂之地漿水。另用井水一甕，入油一匙，浮於水面，將此藥撒在油花上。其藥自沈碗底，去清水，用煎地漿水調服。名油墜散。一切風熱上壅，咽喉不利，加青黛薄荷少許，蜜丸，隨化。一切寒症，瀉痢嘔吐，反胃，加藳姜五錢，名溫六九。中寒甚者，再加硫黃少許，用生姜汁浸，炒餅丸，又能伐肝邪。一切暑症，作渴，新汲水下，感田禾燒氣，作渴，用帶泥稻稈煎湯下。一切濕熱，腸癖泄瀉，其滑石用牡丹皮煮過，加紅麴五錢，名清六九。用陳米飲丸，每五七十丸，白湯下。如產後腹痛，自利，用補脾補血藥下，或加五靈脂一兩，能行血，止痢瀉甚，加肉豆蔻少許。一切痰熱，吐逆反胃，驚癇，顛狂熱毒，癰疽腹痛，加黃丹少許，姜汁蒸餅為丸，服如溫暑。輕者通用丸，味辛，活湯加栽入裏，加大黃。梔子升麻湯合。

**秋令之晚發** 生地甘寒三錢，山梔苦寒升麻甘苦寒柴胡服治晚發傷寒，太陽症具不可大汗，宜此清肌解熱兼治濕熱及虛煩不止，自汗，加桂枝無汗，加蘇葉乾葛，虛煩加



知母麥門冬渴加天花粉咳嗽加杏仁此方潤燥深合愚  
意以秋為晚發經曰燥淫於內治以苦溫佐以甘辛正此  
方之謂也他如張子和六神通解散用蒼朮石羔滑石黃  
芩茯苓甘草姜葱煎服雖以三月為晚發亦不甚宜或疑  
冬傷於寒春必病溫晚發乃溫病之遲者夏傷於暑秋必  
病瘧豈可以秋病為晚發耶殊不知瘧有一日一發或熱  
多寒少者其邪淺夏傷於暑而然也有二日一發或寒多  
熱少者其邪深結成瘧母非隔冬寒邪鬱伏後再感暑而  
後發動若本夏所感之邪安能遂成瘧鬼耶  
所以秋病多於四時者此也推之痢症亦然白芍生地欽  
冬月之愆陽加減調中湯白芍一錢半茯苓白朮各八分  
甘草各二分水煎溫服治冬溫及春月暴發煩躁眠食不  
安或掀脫欲作傷風狀者如體盛加黃芩有痰加貝母  
中若中喝白虎或加參朮白虎加參湯石羔五錢知母人  
參各二錢甘草五分粳米一大  
撮水煎溫服服盡煩不止加麥門冬尤妙治動中喝傷氣身  
熱脉洪或遲煩渴口燥小便已而熱毛聳口開前版齒燥



黑兼治發斑故又名化斑湯○白虎加蒼湯石羔四錢知  
母三錢蒼朮二錢甘草五分粳米一大撮水煎溫服自汗  
不止加桂枝尤妙治靜中身傷濕惡寒脉沉  
汗出身熱妄言各濕溫兼治疫癘及秋感熱暴寒暴溫調

中湯或去大黃葛根黃芩芍藥棗本白朮桔梗茯苓甘草  
各五分水煎溫服治夏秋暴寒疫癘折於

盛熱熱結於四肢則壯熱頭疼及肚腹不和等症如暴溫  
肌熱煩渴加麥門冬如暴寒傷胃表裏邪盛或便閉或協  
熱下利血水脉數及年久臟毒下血不止者俱  
加大黃七錢下之移時再服得利壯熱自止風溫汗渴

萎蕤兼以瓜蒌萎蕤湯萎蕤二錢半石羔三錢葛根二錢  
羌活白薇杏仁青木香川芎甘草各一錢

麻黃一錢二分水煎溫服治風溫喘急頭痛身熱多瞤語  
言蹇澁自汗四肢不收甚者如癰內煩躁擾冬溫春溫亦  
宜如汗後身猶熱加黃芩知母赤芍汗多去麻黃加桂枝  
防風氣弱加人參有痰目睛不了者加南星渴甚加天花  
粉肝火熱加龍膽草○瓜蒌根湯石羔三錢瓜蒌根葛根  
各二錢人參防風各一錢甘草五分水煎溫服治風溫渴



甚身熱濕溫汗多茯苓和以桂木茯苓白木湯茯苓乾姜

枝七分甘草五分水煎溫服方意以濕溫寒熱頭目疼痛

胃滿妄言多汗兩脛逆冷者皆因暑浴冷坐石眠地為濕

氣所傷復感暑搏而為病是以藥品盡皆治濕而非治暑

也所以各家亦有未許此意而不敢用故以白虎湯加蒼

朮官桂其意更明然二方亦皆難用輕風濕腫痛勝濕表

者但以二香等湯去暑除濕等湯去濕風濕腫痛勝濕表

以麻杏四般羌活勝濕湯羌活獨活各一錢藁本防風身

脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經氣不通行肩臂痛

不可回顧此手太陽經氣不行如身重腰流沈然者乃

經中有濕熱也加附子黃柏蒼朮○麻杏薤甘湯麻黃薤

苡仁各二錢杏仁甘草各一錢水煎服取微汗治肢體酸

疼不能轉側額上微汗不欲去衣或身微腫大便難小便

利熱至日晡加劇脉浮虛而滿甚者加川烏為引有汗加

白朮輕者只用九味羌活湯諸濕有表者俱宜○杏仁湯

桂枝二錢天門冬麻黃方藥杏仁各一錢姜五片水煎溫



服治風濕身痛惡風微腫寒濕腫痛溼濕湯表以交加五積散即五積散合入參敗毒散治寒濕身重痛腰脚酸疼如寒濕者只用生料五積散去者加附子夏月去乾姜肉桂加黃連如天時暄熱或春分後雖無汗亦去麻黃換紫蘇葉如肚腹脹滿不快或便閉去參加山查神麴枳實如潮熱或肌熱加柴胡乾葛中濕木附甘附諸濕便溺皆調小便白利輕者除白木三錢附子二錢甘草一錢姜二片棗二枚水煎溫服治中濕一身盡痛發熱身黃多煩脉浮而緩○小便不利太便反快輕者五苓散重者甘草附子湯甘草附子白木各二錢桂枝四錢水煎溫服得微汗即解方意以風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇或風勝則衛氣汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便不利或身微腫是以用桂枝甘草之辛甘而散風邪以固衛附子白木之辛甘而解濕氣以利經如汗出身腫加防風動氣溺不利加茯苓濕痺防已漢已諸濕汗孔皆塞防已黃芪湯防已黃芪各二錢白木一錢半甘



二

草七分姜棗煎服治諸風諸濕脉浮身重自汗及誤汗汗  
出不止如曾膈不和加芍藥氣上衝加桂枝有寒加細辛  
風多走注加麻黃薏苡烏頭熱多赤腫加黃芩寒多掣痛  
加官桂姜附濕多重者加茯苓蒼朮乾姜中氣堅滿癰閉  
加陳皮紫蘇枳殼甚者加葶藶○漢防已湯防已二錢半  
黃芪一錢半白朮二錢甘草一錢姜煎服即防已黃芪湯  
但汗多者  
用此等分附防附朮瘥柔而厥者宜  
附子防風湯白朮茯苓乾姜附子防風川  
芎桂心柴胡甘草各七分五味子九粒姜三片煎服治傷  
寒柔瘥閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止如汗不  
出者去防風姜桂止用三分加麻黃五分○附朮散附子  
白朮各一錢獨活五分川芎三分桂心二分棗二枚水煎  
溫服治傷寒柔瘥手足逆冷筋脉拘急汗出不止時發時  
止不食下利者難治如輕者剛柔通用九味羌活湯加熾  
桂石桂  
瘥熱而重者速  
母各三錢黃芩二錢水煎溫服  
治太陽陽明合病間日作瘥熱多寒少○桂枝黃芩湯知  
母人參黃芩半夏各八分柴胡一錢石膏二錢桂枝五分



甘草四分姜煎溫服治太陽陽明少陽合病瘧疾寒熱極甚二方以桂枝湯料治太陽白虎治陽明柴胡治少陽意甚明顯按瘧合二陳湯食積合平胃散溺溢合五苓散便閉合大柴胡無汗加乾葛蒼朮有汗加黃芪白朮夜發加苑仁白芍日久加常山檳榔吐之治瘧之法盡矣

水乘表而發咳青龍小劑

小青龍湯

桂枝麻黃芍藥乾姜各二錢細辛一錢半夏一錢半五味子甘草各五分水煎溫服治傷寒表不解因心下有水飲與寒相搏氣逆乾嘔發熱而咳或喘或噎或渴或大便利或小便不利脇痛腹滿等症蓋寒邪在表宜桂枝麻黃甘草辛甘以散之水停心下而不行則腎燥宜姜半夏細辛之辛行水氣而潤腎咳逆而喘肺氣逆也宜芍藥五味之酸以收之肺氣經曰腎苦燥急食辛以潤之肺欲辛急食酸以收之此方發汗所以散邪水收斂所以固真水水氣內清傳變不一故有或為之症宜隨症加減以解化之如微利去麻黃加羌活以下水渴者去半夏加瓜蒌仁以生津壅者去麻黃加附子以溫散水寒小便不利小腹滿去麻黃加茯苓以行下焦蓄水喘者去麻黃加杏仁以下氣凡服此



渴者裏氣溫水欲散也宜再服之或疑小青龍與小柴胡症皆嘔而發熱表裏之病太繁彷彿何二方寒熱不同蓋傷寒熱未盛而飲水停蓄非青龍姜桂不能解散傷寒邪熱傳半表裏非小柴柴芩無以清解此二方症治同而用藥殊

水入陰而下利玄武神方

玄武湯白朮一錢白茯苓

煎溫服治傷寒四五日腹痛小便不利大便秘自利四肢重痛或發熱或瀉利或嘔或咳兼治汗後仍熱心悸頭眩及陰凝身痛脉沈汗過筋惕肉瞤此由渴後飲水停留中脘所至方意以腎主水腎病則不能制水是以用姜附芍藥之辛酸以溫腎散濕茯苓白朮之甘平以益脾逐水經曰寒淫所勝治以辛熱濕淫所勝佐以酸平是也如小便利則無伏水去茯苓大便秘去芍藥加乾姜以散寒咳加五味子以散逆氣水寒相搏而咳加細辛乾姜以散之嘔者去附子恐補氣也茵陳大黃調五苓頭汗出而欲疽茵陳倍生薑以散逆氣

陳稿一兩大黃五錢山梔十枚水二盞慢火熬至一盞溫服以利為度甚者再服當下如爛魚膿血惡物小便下如



下

金色皂角等汁或見熱症但頭汗出將欲發黃者用此  
劑分作四服入五苓散三錢調下治黃之法無踰於此  
意以陽明裏熱已極煩渴引飲以致濕與熱搏如得遍身  
汗出則濕熱發越於外而不能發黃也今但頭出汗劑頭  
而還二便不利渴且不止則瘵熱鬱內腹作脹滿而黃疸  
必矣是以用茵陳山梔之苦寒以除胃燥大黃之苦寒以  
下胃熱一切疫癘疽瘡雜病發黃等症及傷寒因火逼取  
汗不出反致邪熱怫鬱於內上攻頭面紅赤蒸於肌膚發  
黃並宜○茵陳五苓散茵陳一兩五苓散五錢為末每二  
錢米飲下或煎亦可治同上○茵陳湯大黃茵陳山  
梔厚朴枳實黃芩甘草姜一片燈心一握水煎熱服治同  
上如太便利去大黃厚朴加大腹皮以小便清利為度  
茵陳梔子皆三物太便利而發黃茵陳三物湯茵陳三錢  
溫服治同上○梔子柏皮湯山梔四枚黃柏四錢甘草二  
錢半水煎服治濕家發黃及傷寒發黃但太便利者茵  
陳湯二便不利者茵陳湯調五苓散大便利小使不利者  
茵陳五苓散茵陳三物湯梔子柏皮湯正所謂小熱之氣



束以和之太熱之氣寒以堅之  
**虛煩竹葉石膏湯**  
既濟三白稱奇  
竹葉石膏湯石羔五

錢人參二錢麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分淡竹葉十四片粳米一大撮水煎入姜汁二匙調服治傷寒解後餘熱未淨津液不足虛羸少氣氣逆欲吐及陽明汗多而渴衄而渴欲飲水水入即吐并瘧後下後虛煩汗多等症經曰辛甘發散而除熱竹葉石膏湯之甘辛以發散除熱甘緩脾而益氣門冬參米之甘以補不足辛者散也半夏之辛以散逆氣如氣弱太渴倍入參汗多加黃芪陰虛夜煩加知柏生地芍藥嘔吐去石膏加陳皮茯苓痰加貝母泄加白朮澤瀉又本方去參石半夏麥門冬湯治勞復發熱○斷續湯即竹葉石膏湯去石膏加附子二錢治虛煩上盛下虛煩躁自利手足冷○三白湯白芍白朮白茯苓各一錢并甘草五分水煎溫服治虛煩或泄或渴實調理內傷外感

之奇方也  
**脚氣續命千金難賣**  
續命千金難賣  
童便酒各半盞煎數沸去渣入續命末二錢調服治脚氣風腫痛○此脾湯石羔三錢白朮三兩附子一錢半麻黃



二錢其草一錢二分姜棗煎服治風痺脚弱方意以脾為  
為脾臟主行津液是湯所以名脾者以其能發越脾氣通  
行津液也千金續命湯防風芍藥白朮各一錢川芎防  
已桂枝麻黃羌活各八分蒼朮一錢半甘草五分姜三片  
第二救燈心甘草水煎八姜汁二匙調服治脚氣外症全  
類傷寒但初起脚膝屈伸艱難加之嘔吐喘急宜此救  
如暑中三陽所患心熱脉洪數者云桂枝湯加蒼連柴胡黃  
柏寒中三陰所患必冷脉遲澀者加附子此於濕者則行  
起忽倒足心或腫膝或枯槁加木瓜橫斷牛膝起於風者  
則脉浮弦無汗加獨活氣血加入參便閉去麻黃白朮加  
黃連黃芩陶氏加以蒼連參木梗瓜蒌陶氏導痰湯於

八分半夏一錢陳皮黃芩白朮黃連瓜蒌仁各五分桔梗  
四分人參三分甘草二分姜二十片棗二枚水煎服入  
淋寒汁調下年力壯盛者先吐去痰次服此藥治內傷亡  
情痰迷心竅神不安寐神出舍空則痰生以致增寒壯熱  
頭痛昏迷上氣喘急口出涎沫等症如見崇痰症類傷寒  
者亦宜○導痰丹白礬一兩心紅五錢或黃丹亦好為末



每以<sub>二</sub>匙入<sub>二</sub>磁器內溶化<sub>一</sub>棄熱擦<sub>九</sub>龍眼核大薄荷煎湯  
化下<sub>治</sub>結胃胃膈滿痛及痰症發熱或咽喉如<sub>九</sub>抽鋸者<sub>一</sub>

平胃消食陶氏加以<sub>三</sub>其連枳木姜查麴<sub>二</sub>陶氏平胃散蒼木

木各七分甘草薑山查神麴各二分草葉三分黃連枳  
實各四分姜三片水煎服入木香磨汁調下<sub>治</sub>食積類

傷寒如腹痛加<sub>二</sub>杏仁<sub>一</sub>精甚大便實熱去查麴菓姜加大黃  
下之如<sub>二</sub>心中兀兀欲吐<sub>一</sub>不吐無奈者用<sub>二</sub>滾湯調<sub>一</sub>皂莢末

五分<sub>探吐</sub>瘀血在上犀角地黃湯加<sub>二</sub>犀角牡丹皮各一錢白  
芍二錢半生地三錢一

方有當歸一錢半水煎溫服<sub>治</sub>傷寒汗下不解<sub>二</sub>發狂<sub>一</sub>經絡  
或為<sub>二</sub>吐衄<sub>一</sub>不盡餘血停處以致<sub>二</sub>微發黃<sub>一</sub>便黑煩躁發狂

水不<sub>二</sub>熱等症<sub>一</sub>如表熱加<sub>二</sub>柴胡黃芩<sub>一</sub>鼻衄加<sub>二</sub>山梔內熱甚  
加黃連<sub>治</sub>腹脹或痛瘀血去下加<sub>二</sub>杏仁紅花<sub>一</sub>入黃小腹痛

加<sub>二</sub>青皮<sub>一</sub>本方陶氏加<sub>二</sub>甘草桔梗陳皮紅花<sub>一</sub>常歸  
姜三片煎服入<sub>二</sub>藕節藕汁<sub>一</sub>三匙調下<sub>治</sub>同上<sub>二</sub>瘀血在裏

桃仁承氣抵當<sub>二</sub>桃仁承氣湯<sub>一</sub>大黃四錢桃仁三錢桂枝芒  
硝各二錢甘草一錢水煎服<sub>治</sub>血盛為度



未盡其方意以太陽經也膀胱府也太陽經熱不解則

入府而結於膀胱令人如狂熱逼血自下者愈若熱傳血

蓄下焦令人小腹急結便黑溺澀尿沈有力為一更瘀血

結曾諸諸漱水等症宜此湯攻盡黑物則愈若外症未解

當先解其外而後攻其裏經曰從外之內而盛於內者先

調其外而後調其內此之謂也故用桃仁之牛緩小腹急

結律夜之辛散下焦蓄血硝黃之寒折膀胱之熱本方

氏加芍藥柴胡青皮當歸枳實姜三片煎服熟入蘇木汁

三匙調服治同上○抵當湯瘀血水蛭桃仁各十枚大黃

三錢水煎服人壯者五錢水煎溫服未下再服方意以太陽

經病六七日邪當傳裏為熱結胃症今表症仍在脈沈而

熱不結胃反結於下焦令人如狂小腹硬滿小便不利者

乃熱蓄津液不通也小便利者乃熱不蓄津液而蓄血也

蓋鹹走血苦勝血故用蜜蛭之鹹苦以除蓄血其緩結苦

泄熱故用飛黃之甘苦以下結熱亦治一切瘀血結胃諸

語漱水等症○抵當丸水蛭各七箇蜜蛭八箇大黃

一兩為末蜜調分作四丸每丸用米煎化溫服未下再

服治蓄血在下無身熱便黑喜忘如狂等症但小腹滿而



弱利者宜此

九緩以下之

散

感寒香蘇五積

香蘇散香附紫

一錢甘草五分姜葱煎服取汗治四時感寒頭疼發熱惡

寒如頭痛甚加川芎白芷無汗加麻黃○人參養胃湯

木一錢陳皮厚朴半夏各七分半茯苓藿香各五分甘草

二分烏梅一箇人參草菓各四分姜二片棗二枚煎熱服

取汗有汗溫服治外感風寒內傷牛冷增寒壯熱頭目昏

疼肢體拘急不問風寒二症及夾食傳痰皆効兼治飲食

傷脾或外感風寒濕氣發為瘰癧及胃風參蘇十神敗毒

山嵐瘴疫丸妙如風寒加附子肉桂

更速參蘇散人參紫蘇前胡半夏乾葛茯苓木香各七分

半陳皮桔梗枳殼各五分姜三片棗二枚水煎服治

外感風邪頭疼發熱咳嗽聲重喘嚕稠粘內因七情痰塞

壅胃潮熱等症加肺熱去參加白朮黃芩肺燥去橘半加

爪藥杏仁本方去木香加川芎紫蘇各十味苦蘇散治四

時感寒頭疼寒熱○十神湯紫蘇香附陳皮甘草乾葛赤

芍升麻白芷川芎麻黃各五分姜葱煎熱服治風寒兩感

及時行溫疫頭疼寒熱無汗等症此方去芍芷麻黃各蘇



葛湯內乾葛專解陽明瘟疫風邪若太陽傷寒發熱用之  
是引賊入陽明多發瘰癧今世醫用誤哉○人參敗毒散

羌活獨活柴胡前胡枳殼梗川芎赤茯苓人參各三分甘  
草一分半姜三片煎溫服或加薄荷少許治陽寒發熱頭

疼睛痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞聲重反時行瘟疫  
瘴氣風濕風痰眩暈嘔噦等症如三陽經脚氣赤腫加大

黃芩木皮膏疹痒加蟬退如心經蘊熱口乾舌燥加黃芩二陳四物痰火消二陳湯合

湯加參朮火盛加麥冬補中益氣勞傷服加味補中益氣湯外感  
加麥連麥門冬補中益氣勞傷服見太陽症加羌活藁朮

桂枝陽明症加葛根升麻少陽症加黃芩半夏倍柴胡太  
陰症加枳實厚朴少陰症加生耳草桔梗厥陰症加川芎

變症發熱加葛根玄參倍升麻○陶氏補中益氣湯人參  
黃芪當歸生地川芎柴胡陳皮甘草細辛羌活防風白朮

姜三片棗二枚葱二莖水煎溫服治勞力內傷氣血外感  
風寒頭疼身熱惡寒微渴自汗身腿酸軟無力氣血不

足者加升麻少許以升之喘嗽加杏仁汗不止去細辛加  
芍藥胃中煩熱加山梔竹茹乾嘔加姜汁炒半夏胃中飽

加

芍藥

芍藥



問夫生地耳草芪朮加枳壳枳梗痰盛去防風細辛加瓜  
蒌貝母腹瀉去芪朮加芍藥乾姜因血鬱內傷有痛屬或  
大便黑去羌防芪朮細辛加薤仁紅花甚者加大黃下盡  
瘀血自愈愈後去大黃調理日夕下症具者亦量加酒製  
大黃體厚者大柴胡下之○丹溪治一人舊有下疳瘡忽  
頭疼發熱惡寒以水柴胡湯加龍膽草胡黃連熱服而安  
又一人因忍饑霜中涉水患縣寒吐血以水建中湯去芍  
藥加陳皮半夏煎服而安二方可為內傷挾外感者式  
葱豉麻葛頭痛甚於地黃連鬚葱白湯生薑一兩葱十四  
枚汗頭痛如鑽微或合麻黃湯尤妙○葱豉湯葱白七莖  
豆豉一合麻黃三錢葛根一錢半姜五片煎服如行五里  
許再進一服良久吃葱豉粥取汗治太陽陽明頭疼無汗  
如太陽發熱惡寒無汗剛症加芍藥三錢名麻黃葛根湯  
○葛根葱白湯葛根芍藥知母各一錢半川芎生  
姜各三錢葱三莖煎服治陽明頭目痛鼻乾無汗桂枝柴  
葛項強難於回顧大陽無汗項強葛根湯有汗桂  
枝湯加葛根半陽小柴胡湯頭眩身



擬茯苓桂枝湯和陽

茯苓桂枝湯茯苓三錢桂枝二錢

時症在頭眩不惡寒能食而咳兼治水氣在平素乘於心胃性怯悸惕常嘔自汗不渴方意以茯苓甘草之甘益津而和衛桂枝生薑之辛助陽而解表○茯苓桂枝甘草湯茯苓六錢半甘草二錢二分桂枝四分木棗五枚先取水六七碗置大盆內以杓揚之上有水珠數十顆相逐取用之各甘爛水用二盞并煎茯苓桂枝半入諸藥煎至八分溫服治汗後膈下悸動發熱奔豚者○茯苓桂枝甘草湯茯苓四錢桂枝三錢白朮二錢甘草一錢水煎溫服治汗出下後重虛氣逆上衝心腹痞滿或痛逆則頭眩眩暈眩暈為在重則不宜汗汗則外動經絡損傷陽氣陽虛則不能主持諸脉身體振搖筋脉惕瞤久則成痿宜此湯以和經益陽故陽氣不足者補之以其茯苓甘草之甘以生津液而益陽也專氣逆者散之以辛桂枝之辛以行陽而散逆氣也

鬱胃神昏人參三由三生

醒胃

人參三由白朮人參白朮白芍白茯苓各一錢半柴胡三錢川芎一錢天麻五分水煎溫服治太陽病誤下誤



汗表裏俱虛以致鬱冒胃家得汗自愈若不得汗而不解者宜此主之如下虛微弱者合三生飲以溫腎固其本也經曰滋苗者必固其根

背惡寒而三陽經湯少陰附湯

傷寒六七日身無大熱口燥渴心煩背惡寒者此屬陽明宜白虎加參湯○傷寒二三日口中和背惡寒者此屬少

陰宜附子湯附子人參各二錢茯苓芍藥各三錢白朮四錢水煎溫服兼治少陰身痛肢冷骨節煩疼方意以附子之辛以散寒參朮茯苓之甘以補陽芍藥之酸以補陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

身惡寒而陽經柴桂陰經芪桂

陽經柴胡桂枝湯柴胡一錢桂枝黃芩人參芍藥各

夏各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎服治少陽弱頭額痛項強脇痛胃滿發熱惡寒不往來及自汗亡陽證語作渴兼治風溫汗後身熱及動氣等症或小柴胡湯桂枝湯麻黃湯選用○陰經直中者黃芪建中湯四逆湯小

建中湯選用

惡風漏汗木附加入桂枝

桂枝附子湯桂枝附子各三錢芍藥二錢甘草



一錢姜五片棗二枚水煎溫服治太陽病發汗遂漏汗不止惡風溺難四肢拘急難以屈伸兼治傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛者以過汗則陽虛不固汗出多則津液亡而小便難四肢諸陽之本液脫若滑屈伸不利是以用桂枝甘草辛甘以溫經附子辛熱姜棗辛甘通津液以和表也如裏寒去芍藥小便利去桂枝加白朮發潮熱欲疸者兼以赤豆連翹即連翹根麻黃各二錢生梓白皮三錢赤小豆半合甘草一錢杏仁七箇姜三片棗二枚潦水煎溫服或加山梔茵陳黃柏尤妙治陽明身熱發黃方意以麻杏甘草姜棗之甘辛微發其汗而散表分之寒濕連翹梓皮之苦寒以除內熱赤豆之甘平以散在表之濕熱煎用潦水者取其味薄而不助濕也如天氣暄熱或有汗去麻黃加柴胡內熱盛加黃芩黃連大便秘實加枳殼大黃口渴加天花粉以瘧面赤身痒桂二麻一各半湯桂枝芍藥各二錢麻黃一錢二分甘草一錢杏仁八分姜五片棗三枚水煎溫服治太陽病服桂枝湯後似瘧熱



多寒少者乃邪客榮衛也脈必洪大用此發汗必解○桂  
麻各半湯麻黃一錢半桂枝芍藥杏仁各一錢甘草七分  
姜三片棗二枚煎服治傷寒六七日發熱惡寒舌不短囊  
不縮脈浮變便清為不傳陰經欲愈此厥陰似瘧也如不  
愈者宜此又太陽病日久似瘧寒熱或熱多寒少其人小  
嘔大小便調裏和欲愈者裏虛脈微表虛惡寒表裏俱虛  
面色青白今面反赤者表未解也其  
身必痒宜此湯微發其汗以除表邪以瘧熱多寒少桂

### 二越一合湯

桂枝二越婢上一湯桂枝麻黃芍藥各一錢石  
脂二錢甘草二分姜三片棗二枚水煎溫服

治肺弱亡陽

柴桂柴姜往來寒熱極驗

柴胡加桂湯柴胡  
三錢黃芩桂枝各

二錢半夏一錢甘草四分姜三片棗二枚水煎溫服治半  
表裏証盜汗身熱不欲去衣及不瀉不硬但心下妨悶謂  
之支結百病云若有頭疼惡寒者小柴加桂值千金○柴  
胡桂姜湯柴胡三錢桂枝芍藥各一錢半天花粉黃芩各  
二錢甘草一錢甘草八分水煎溫服方意以傷寒五六日  
已經汗下則邪當解今胃滿微結心煩寒熱往來邪在半



表平裏凡小便不利而渴者必嘔今便利渴而不嘔者裏無熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而他處無者津液不足而陽虛也是以用柴胡之苦以解傳表之邪桂枝之辛以散在表之邪牡蠣之鹹以消胃腸之滿炮姜之辛以和陽虛之汗天花粉之苦以生津液

**陰旦陽旦表裏寒熱堪**  
陰旦湯黃芩芍藥甘草各二錢桂枝四錢棗二枚水煎溫服治陰症身大熱欲近衣腹節痛口不燥而虛煩者此為內寒外熱也

○陽旦湯桂枝芍藥各三錢黃芩二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治裏熱表寒如夏至後更加知母石羔或升麻不然恐有發黃爽出之變

**辛湯真裏寒白通**  
湯  
**葱附無差**  
葱白四壺生附子一枚乾姜一兩水煎溫服治少陰客寒

不能制水脉微自利不止方意以葱白之辛通陽氣姜附之辛散陰寒經云腎苦燥急食辛以潤之是也煩躁

厥逆自利或無汗而不眠芍黃連鷄子湯攪勻黃連一錢半黃芩附



膠芍藥各一錢水二盞煎至一盞去查寒熱入阿膠令溶  
化少溫入鷄子半枚攪勻溫服脈經曰風傷陽寒傷陰少  
陰受病得之二三日已上寒極變熱為陽入陰也脈沈無  
大熱心中煩躁不卧厥逆自利不得汗方意以陽有餘以  
苦除之於連之苦以除熱陰不足以其補之鷄子阿膠之  
其以補血酸收也瀉也芍藥之酸收陰氣而瀉邪熱所謂  
宜瀉必以苦宜補必以甘此方兼之煩躁厥逆欲吐或洩難而脚蹇芍乾姜

甘草簡易 甘草乾姜湯甘草四錢乾姜二錢水煎服○芍  
藥甘草湯白芍甘草各三錢水煎溫服方意以

傷寒脉浮自汗小便數而微惡寒者陽氣不足也心煩足  
蹇者陰氣不足也陰陽俱虛若誤用桂枝發表則便厥咽  
乾煩躁吐逆是以先宜甘草乾姜辛甘發散以復陽氣而  
厥愈是溫心煩暑更作芍藥甘草酸甘相合以補陰血其  
脚脛諸汗不止者防木牡蠣湯外用米粉撲乾湯防風白  
朮升麻各等分為末每一錢米飲或酒下日三服汗止服  
小建中湯治煩躁惡風不得卧汗出不止及久邪汗多煩



躁者尤妙。○撲汗法白朮藁本川芎白芷各二錢半為末入米粉一兩半和勻以綃袋盛貯過身撲之治汗出多不得取汗不得者陶氏再造散外用麩糠鋪地陶氏再造散

我甘草附子細辛羌活防風川芎煨生姜夏月加黃芩石膏二枚煎耳加炒芍藥一撮煎三沸溫服治亡陽症陽虛不能作汗誤用重湯火劫取汗者死○蒸汗法先須燒地令熱以水洒之取熱氣相乘枕葉糠墊皆鋪燒地上

側掌許然後鋪席令人當卧其上以被覆之多時汗出週身至足心用藁本末撲之上床而睡此法取汗雖易問載范雲用之

後二年卒死夜睡盜汗小柴去平滋陰乎傷寒盜汗責表熱雜病責

陰虛古法柴胡加桂湯主之王氏以小柴去半夏冬病陽加當歸生地芍藥麥門冬知母黃柏酸棗仁亦好

明黃芩等方蜜導耳盜汗本屬少陽半表裏病冬月陽明症潮熱發作有時脉但浮者為有風

宜有汗而天寒無汗夜睡必有盜汗黃芩湯主之黃芩二錢芍藥二錢甘草五分棗二枚煎服有嘔者去棗加生姜

錢芍藥二錢甘草五分棗二枚煎服有嘔者去棗加生姜



平夏以下逆氣此方本治太陽少陽合病自利兼治一切  
失血經曰虛而不實者以苦堅之以酸收之是用芍藥之  
苦酸以堅歛腸胃之氣弱而不足者以甘潤之其甘草大棗  
之甘以補固腸胃之弱○蜜導法用白蜜半盞於銅杓內  
微火熬令滴水不散入皂角末二錢攪勻捻成小棗大長  
寸兩頭銳蕤香油推入穀道中大便秘即急而去如不通再  
易一條外以布捲肛門氣忍注蜜待糞  
至方放開布治陽明自汗濇利不可收小柴加瓜 湯汗後

嘔而渴煩

即小柴胡湯去平夏  
加入參加瓜蒌根

大柴去黃汗後嘔而自利

大柴胡湯

下後熱甚

去黃

清肌以生薑汁一合無生薑  
以乾艾水浸搗汁

蘼五錢苦酒五合煎至三分分三次服大下後下後寒

芍藥附子補髓

芍藥附子甘草湯三味各三錢水煎溫服  
方意以傷寒汗下後則解今反惡寒者下

過傷榮也或撮空耳聾者汗過亡陽也是以用芍藥之酸  
斂津液而益榮附子辛熱固陽氣而補胃甘草調和辛酸



以安風熱咳嗽金沸草散能除旋覆花四分別芥八分麻

半夏各二分姜三片棗一枚水煎用細絹漉過免毛壯肺

咳嗽不已治肺受風寒頸項強急肢體煩疼寒熱往來頭

目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘胃膈痞悶喘滿及時行寒疫

壯熱惡風又治一切風熱及風痰壅盛痰涎不利等症如

諸風及太陽風氣左脇刺痛加枳殼風熱臃腫煩躁氣壅

腹痛大便閉加硝黃薄荷好歸傷寒頭痛壯熱心煩加參

朮黃芩石羔熟款加葶藶薤白薄荷桑白

皮烏梅喉中焦燥加枳殼牙疼熱煎灌漱汗後身痛桂枝

加參湯桂枝芍藥各三錢人參二錢甘草一錢姜三

沈黑奴丸渴比常而倍加黃芩益母草麻黃大黃各等分爲

未蜜丸彈子大每一丸新汲水化服須臾發寒汗出而瘥

未汗再服須臾見微利如不大渴不可輕用治陽毒發瘕煩

躁大渴倍常猪苓湯渴後嘔而不止佛鬱汗下胃虛桂枝

麻黃大散實



**參苓** 桂枝參苓湯 桂枝方藥各三錢 人參茯苓各二錢 甘草一錢 姜棗煎 溫服 治汗吐下後胃虛而嘔 佛鬱而

**赤** **戴陽陰火躁悶益元附草** 陶氏益元湯 甘草二錢 附子

廿粒 麥門冬 黃連 知母 各七分 艾三分 葱三莖 姜一片 棗

二枚 水煎 臨熟入 童便三匙 現令服 治無頭疼 有身熱 躁

悶 面赤 飲水不得 入口 乃氣弱 無根 虛火 泛上 名曰戴陽

症 是以用附子之鹹 補腎 姜葱之辛 潤腎 甘草參麥甘以

緩之 五味酸以收之 蓮艾知母苦以發之 經曰火淫於內

治以鹹冷 佐以苦辛 以甘緩之 以酸收之 以苦發之 降之

是也 **麻黃升麻** 湯 麻黃升麻方 藥黃芩芍藥

服微汗 治傷寒 太陽不解 血隨氣逆 鼻衄 俗謂紅汗 一方

加桂枝 歸尾 天門冬 知母 姜白朮 乾姜 治傷寒 六七日

邪傳厥陰 大下後 寸脈沈遲 尺脈不至 咽喉不利 嘔吐 體

血 手足厥逆 泄不止 者難治 方意以太熱之氣 寒以取之

甚熱之氣 汗以發之 是用麻黃升麻之甘 以發浮熱 當歸

桂姜之辛 以散寒 知母黃芩之苦 以涼心 去熱 茯苓白朮



之井以緩肝生津為藥之酸以收逆氣  
姜藥門冬石羔其草之井以潤肺除熱升陽散火入手胃

心是寶隋氏升陽散火湯人參當歸柴胡芍藥黃芩甘草  
白朮麥門冬陳皮茯苓神各等分姜三片棗一枚入

熟金同煎服治撮空症乃肝熱乘肺元氣虛弱不能主持  
以致譫語神昏不省人事消利者可治不利者死如有痰

加姜汁半夏夏便燥譫語渴加  
大黃泄漏加升麻炒白朮柴芍枳甘何憂熱厥似陰四逆

草枳實柴胡身藥各一錢為末每二錢米飲下方意以邪  
熱入深則手足厥冷是以用枳實之苦佐其草以瀉裏熱

芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱經曰熱淫於內  
以酸收之以苦發之是也如咳者肺寒氣逆下痢者肺熱

大腸為表裏加五味子以收逆氣乾姜以散肺寒降者氣  
虛而不能通行心下築築然悸動加桂枝以通陽氣小便

不利加茯苓以淡滲之裏虛腹痛加附子以補虛泄利後  
重下焦氣滯也加韭白以泄氣滯凡腎病體有動者皆可

服之青布生薑可洗舌胎裂稿擦舌法凡胎白而滑者用生  
姜蘸蜜擦之○胎黃赤燥澀



者用真青布裹指蘸冷水頻頻擦之熱輕者其胎易脫重者擦而難脫必大下津液還而胎退若下後依然唇口燥極身發大熱胎結不或或黑者死

口燥內亡津液按火滋陰養榮

榮湯當

歸二錢人參生地各一錢半麥門冬芍藥知母黃柏各一錢五味子十四粒甘草四分水煎溫服治汗下過多內亡津液或病後水虧氣喘腹有濡滿屬陰化痰生痰

汗下後

氣喘腹有濡滿屬陰化痰生痰

火炎口燥咽乾

藥者二陳湯加姜汁竹瀝凡喘多痰皆宜

○氣虛者

加味

生肌散五味子三錢人參麥門冬杏仁陳皮各二錢姜五

片棗二枚水煎溫服治手足厥逆脈伏喘促者危姑以此

救之○氣虛甚者人參湯人參五錢甚者一兩水一盞

半煎至半盞服之喘定者生不定者死治元氣素虛傷寒

汗下後氣短氣喘目反脈微精神困怠如血虛加當歸

不至加麥門冬五味子

加乾姜冷其加附子茯苓白朮

汗後喘微者桂枝麻石

要可寧

桂枝加朴杏湯治太陽病汗下後微喘者此表未



錢以除氣。麻杏石甘湯麻黃三錢杏仁一錢半甘草一錢石羔五錢水煎溫服治汗下後汗出而喘身無大熱治方意以汗出而喘有大熱者裏熱甚也無大熱者表邪甚也宜此湯以散其邪或疑汗下後同病者蓋汗下雖不同而邪在表則一也凡汗吐下後治法下後喘逆者葛根

**連宜選擇**

湯葛根二錢黃芩黃連各二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治太陽桂枝証誤下自

利不止脈促喘而汗出方意以誤下則腸胃虛而為熱所乘遂協熱自利不止脈促者為陽盛知表未解也若脈微邪在裏也凡病自汗出而喘者乃邪氣外甚所致因喘而汗出者乃裏熱氣逆所致故用葛根甘草之其以散表邪以除裏熱汗下虛喘姜苓連參橘皮竹茹最靈

乾姜苓連人參湯乾

姜黃芩黃連人參各三錢水煎溫服治傷寒食入即吐謂之寒格及胃經汗下關連胃虛冷嘔吐方意以參姜之其辛以補正氣苓連之苦以通寒邪內格橘皮竹茹湯人參三錢陳皮五錢甘草一錢竹茹一團姜五片水煎溫服



經四時傷風寒冷濕鼻塞  
喉鳴上氣不得下而咳嗽  
**陰症** 乾逆 羌活 丁茴 橘皮 乾姜

**任責** 羌活 附子 湯羌活 一錢 炮附子 半枚 茴香 丁茴 乾姜  
各一錢 半水煎入薑一握 煮服 治陰症內寒厥而嘔

**逆** 橘皮 乾姜 湯陳皮 二錢 通草 乾姜 各一錢 人參 一錢  
半水煎服 治傷寒初病但惡寒不發熱口中和脈微細而

乾逆者此寒邪客中焦而氣不得伸  
也或加半夏 夏生薑 丁香 柿蒂 尤妙  
**太橘小橘** 嘔吐煩冷

**分掌** 大橘皮 湯陳皮 甘草 各二錢 人參 五錢 姜 七片 水煎  
服治嘔噦胃清重煩不安 小橘皮 湯陳皮 五錢 生

姜 一兩 水煎溫服  
治嘔噦手足厥冷 大半小半 乾逆痰飲不食 夏茯苓 生薑

各二錢 半臨臥水煎服 治傷寒痰症及惡心振暈如痰熱  
加甘草 胃不和加陳皮 小半夏 湯半夏 五錢 生薑 一兩

水煎溫服 治乾逆穀氣入口  
即吐及發汗後水藥不下 水不入而搗姜汁更煎半夏

以實胃 生薑汁 半夏 湯半夏 五錢 水一盞 半煎至半 薑八  
生薑汁 半盞 和勻 稍溫緩緩服之 凡嘔吐藥忌煩



服治胃中似喘不喘似嘔不嘔後嘔而忌柴胡須赤茯苓

以快膈赤茯苓湯赤茯苓五錢陳皮人參各二錢白朮川

多水停心主瘡滿頭痛頭汗為水結胃或先渴後嘔或飲後嘔氣上衝或汗下後身體振搖筋惕肉瞤

### 生地芩連或茅花湯而單煎

黃連山梔川芎芍藥柴胡桔

梗甘草犀角棗十枚水煎臨熟入茅根或藕節搗汁磨京

墨調服治鼻吻成流一切去血過多諸語失神撮空閉目

不知人事○生地芩連湯生地川芎當歸各七分赤芍山

施黃芩黃連各二分防風二分水煎徐徐呷之脈實者加

大黃下之治婦人血風症因崩大脫血或前後去血及男

子去血過多因而涸燥其熱未除循衣摸床撮空閉目不

省人事揚手擲足錯語失神脈浮弦而虛內有燥熱之極

氣粗鼻乾上下通燥危症凡氣分燥閉者用大承氣湯血

分燥閉者宜此湯以降血中之火○茅花湯單茅花一大

把無花用根洗淨搗碎水煎濃汁服之或加藕節同煎尤



錢治<sup>二</sup>衄<sup>一</sup>血不止<sup>一</sup>吐<sup>一</sup>黃柏皮或綠袍散以外塞<sup>一</sup>黃連<sup>一</sup>栢皮湯黃<sup>一</sup>

二錢水煎<sup>一</sup>臨熟入<sup>一</sup>阿膠一錢半煮<sup>一</sup>洋溫服<sup>一</sup>治<sup>一</sup>熱毒吐血<sup>一</sup>○

綠袍散黃栢薄荷<sup>一</sup>○硝<sup>一</sup>青黛各<sup>一</sup>等分爲<sup>一</sup>末入<sup>一</sup>水片少許<sup>一</sup>掩<sup>一</sup>

上牙床<sup>一</sup>即止<sup>一</sup>救火逆驚狂身痛柴胡龍牖鉛丹<sup>一</sup>救逆湯桂<sup>一</sup>

三錢甘草二錢牡蠣四錢龍骨二錢半姜五片棗三枚水<sup>一</sup>

二盞先煎<sup>一</sup>獨漆十餘沸入<sup>一</sup>諸藥煎至八分服<sup>一</sup>方意以<sup>一</sup>所出<sup>一</sup>

亡陽<sup>一</sup>則心虛神浮驚狂<sup>一</sup>與桂枝湯以解<sup>一</sup>未盡之表邪<sup>一</sup>芍藥<sup>一</sup>

益陰<sup>一</sup>非亡陽所宜<sup>一</sup>故去<sup>一</sup>之火邪<sup>一</sup>錯逆加獨漆之辛<sup>一</sup>以散<sup>一</sup>之

神氣脫亡<sup>一</sup>加龍牖之澁以<sup>一</sup>收神固<sup>一</sup>陽本<sup>一</sup>草云<sup>一</sup>澁可去脫<sup>一</sup>是<sup>一</sup>

也○桂枝龍骨牡蠣湯桂枝一錢半甘草半牡蠣龍骨各<sup>一</sup>一錢水煎服<sup>一</sup>治<sup>一</sup>一切火逆及誤下<sup>一</sup>裏虛<sup>一</sup>又加溫針<sup>一</sup>致<sup>一</sup>生煩躁<sup>一</sup>

驚狂遺精等症<sup>一</sup>是<sup>一</sup>用桂枝之辛<sup>一</sup>以散<sup>一</sup>經中之火邪<sup>一</sup>龍牖<sup>一</sup>

之澁以<sup>一</sup>收浮越之正氣<sup>一</sup>○柴胡龍骨牡蠣湯柴胡三錢黃<sup>一</sup>

芩人參龍骨牡蠣茯苓桂枝鉛丹半<sup>一</sup>夏各<sup>一</sup>一錢半姜五片<sup>一</sup>

棗三枚水二盞煎<sup>一</sup>至一盞入<sup>一</sup>大黃二錢再煎<sup>一</sup>二三沸溫服<sup>一</sup>

方意以傷寒八九日邪氣將復<sup>一</sup>傳陽經<sup>一</sup>誤下<sup>一</sup>虛其裏而熱<sup>一</sup>



不辭以致胃滿煩驚譫語小便不利皆心胃熱而津液不行故也又一身重痛不可轉側者陽氣內行而不營於表也宜小柴胡以除胃滿加龍膽鉛丹以飲神氣茯苓以行津液利便大黃以除胃熱桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪止譫語錯亂呻吟施子苓連黃柏黃連解毒湯黃連黃

芩黃柏山施各二錢

半水煎溫服治傷寒汗後或因飲酒復劇苦悶乾嘔口燥呻吟錯語煩躁不得睡卧兼治胃熱吐血一切熱毒臟毒

等因痛猪膚甘桔而半桂可起伏寒

猪膚湯猪膚一兩水

蜜下合白粉半合熬香熟和勻相得服之治陽經傳入少

陰客熱下利咽痛胃滿及脉陰陽俱緊主無汗而有汗日

亡陽法當咽痛此屬少陰方意以猪水畜其氣入腎是以

猪膚能解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣漸

利○單甘草湯甘草一兩水一盞半煎至一盞日進三服

治陽邪傳少陰客熱咽痛如寒熱相搏咽痛加桔梗五錢

名其桔湯方意以其草甘平以除熱桔梗辛溫以散寒甘

桔相合以調寒熱而和少陰之氣也○半桂湯半夏桂枝



甘草各二錢姜五片水一盞半煎至七分徐徐嚥之治少陰客寒下利脉微弱而咽痛是以用半夏桂枝辛以散寒甘草之甘喉塞龍骨烏扇而鷄壳能開音黃連龍骨湯以緩正氣

骨一錢七分黃芩芍藥各二錢水煎溫服治少陰腹痛脉沉細有熱而咽痛烏扇湯射干猪脂各四兩同煎去渣取半鷄子黃大綿裹喉中徐徐嚥下凡咽中閉塞不可下者宜用鷄子黃湯半盞下四枚用鷄子留白去黃以苦酒一盞入雞壳內置刀環中安火上煮二沸去渣少少含嚥作三次服治熱傷於筋則經絡乾燥使咽中生瘡不能言鷄子黃湯聲不出者是以用半夏之辛以發聲

音鷄子之甘以緩咽痛苦酒之酸以斂咽瘡升麻六物湯誤汗咽痛及口牙升麻山梔各一錢半大青杏仁黃芩各參各一錢葱二三莖水煎治陽厥應下反

汗必咽痛升麻湯時行咽腫并頭額黃芩黃連柴胡甘草桔梗梗川口瘡牙腫

荆芥防風羌活枳壳連翹射干白芷姜三片煎入牛蒡子一撮再煎一沸入竹瀝姜汁調服治天行大頭病發熱惡



寒頭項咽候腫痛脉洪取作瘕火治凡服宜先加  
大黃利去一二次後去大黃加入參當歸調理  
結胃熱

而有渴大小陷胃十棗湯  
大陷胃湯大黃三錢半病重壯  
芒硝二錢再煎一二沸去渣入甘遂末一分和勻溫服若  
腹中不動再進一服治傷寒表未解醫反下之膈內拒痛  
手不可近短氣心煩懊憹心下鞭大便閉舌燥而渴熱實  
脉沈而緊兼治身無大熱有水結在胃脇間者方意以大  
黃苦以蕩滌芒硝鹹以軟堅甘遂通水可以直達其氣而  
透胃膈之結也但此藥太峻不可輕用如不得已即用大  
陷胃丸○大陷胃丸大黃三錢杏仁葉蘆各二錢芒硝二  
錢半甘遂一分人弱者半分為末蜜丸彈子大每下丸用  
水一盞煎至六分溫服至一宿未動再進下丸以利為度  
治熱實結胃項強如柔荏狀用此下之則和方意以硝黃  
鹹苦以下熱葶杏苦甘以瀉滿甘遂取其直達白蜜取其  
潤利皆以下瀉滿實物也○小陷胃湯黃連三錢半夏一  
錢瓜蒌仁二錢姜三片水煎溫服利黃涎沫即安下方加  
枳殼枳實便黃芩治結胃病正在心按之則痛其脉浮滑方



意以半夏之辛以散結氣黃連之苦以瀉滿實瓜蒌之苦以寬中潤下○十棗湯元花甘遂大戟各等分爲末用大棗十枚水一盞煎至半盞去棗調末五分候弱者減半服服後大便利下水以粥補之治太陽傷風下利嘔逆熱聚汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下疼乾嘔短氣不惡寒及裏水身涼者宜服方意以下利嘔逆爲裏受邪可下汗出不惡寒發作有時爲表已解可攻頭痛脇疼心痞乾嘔短氣水熱內蓄而有伏飲是裏未和也是以用芫花之辛以散飲戟甘之苦以瀉水太棗之甘益土而勝水

結胃寒而不煩枳實理中三

物白

枳實理中丸人參白朮茯苓各一兩甘草乾姜各七錢半以實六錢黃芩二錢半蜜丸彈子大每一丸沸

湯化下治大陰病誤下寒實結胸及傷寒諸吐利後留痞欲絕高起而痛手不可近如渴加天花粉汗利不止加牡蠣三物白散貝母桔梗各三錢巴豆一錢爲末每五分弱者減半白湯調服病在膈上必吐膈下必利若不吐利進熱粥半盞助之若吐利過進冷粥半盞止之治寒實結胸無熱症三黃附子瀉心下痞腹



虛癰

三黃瀉心湯大黃三錢黃芩黃連各一錢半用麻沸

湯瀉藥者取其氣薄而泄虛熱也治心下痞硬內實熱

盛而不太便關脈浮者可服惡寒勿服○附子瀉心湯用

附子半枚水一盞煎至半盞去渣刺入三黃瀉心

湯內和勻分二次溫服治心下痞硬惡寒汗出

姜瀉心下痞軟氣逆半夏瀉心湯半夏一錢五分甘草三

姜三片棗二枚水煎溫服治心下痞滿軟而不痛○甘草

瀉心湯即半夏瀉心湯再加甘草一錢人參一錢半治傷

寒傷胃醫反下之下利日數十行穀不化腹中鳴心下痞

硬乾嘔心煩若再下之痞氣益甚此虛氣上逆也○生薑

瀉心湯生薑半夏各二錢人參乾姜各一錢半黃連甘草

各一錢黃芩五分棗二枚水煎溫服治汗出解後胃中不

利心下痞意氣食臭或脇下有水氣腹中雷鳴泄瀉已上

瀉心湯皆二黃瀉心湯為主大黃芩連之苦寒以瀉心下

之痞然痞為虛熱有惡寒汗出者陽氣外散也加附子以

固陽胃為陽氣之根汗出上津胃虛氣逆痞而乾意食臭



不能消穀或挾水雷鳴下利者土弱不能勝水也加生姜以益胃之陽氣下利不止穀不化乾嘔痞益甚者胃虛氣上逆也加甘草痞而滑利禹餘糧赤石脂禹餘糧湯二味以補胃之陰氣

下痞硬服瀉心湯利不止及傷寒下利不止服理中湯益甚者此乃下焦不約故水穀不分是以用石脂之澁以收斂之禹餘糧之重以鎮固之本甘草云澁可去脫重可去怯是也若服此不止當利小便使兼治汗家重發汗心神恍惚小便已陰

中夜痞而乾噫代赭石旋覆代赭石湯治汗吐下後心下痞硬胃弱

錢姜五片棗二枚水煎溫服治汗吐下後心下痞硬胃弱虛氣上逆乾噫或吐方意以旋覆之鹹而軟痞硬代赭之重而鎮重逆生姜半夏之辛以散痞氣參草大棗之甘以補胃弱

柴陷桂參痞結疎表且和中柴陷湯即小柴胡湯合小陷胃湯治結胃痞氣初起有表及水結痰結熱結等症○桂枝人參湯人參白朮乾姜各一錢甘草桂枝各二錢水煎溫服治太陽症未罷數下之遂成協熱下利而心下痞硬表裏不解者方意



以表邪未解而裏氣又盛故加桂枝於理中湯內也

枳實先服此調氣○枳梗湯枳實桔梗甘草各等分水煎

溫服治結胃痞氣及胃滿不利煩悶欲死不論寒熱通用

如右痰合二陳湯各枳梗二陳湯表熱或寒熱往來加柴

胡黃芩內熱加黃連痰喘加瓜蒌仁口燥去半夏加天花粉

結胃危甚艾灸臍中艾炷如手指大灸之輕者一炷重者不過再

灸俟腹中微熱取下惡物立效灸畢以溫水拍手洗滌不

然生瘡治結胃症危甚手不可按二便閉澀或連日不通

但口中微氣或嘔吐不止諸藥無効痞結會變姜葱畏以絢帛

初出壳黃毛鷄子一隻生薑四兩共搗爛炒微溫攤在胃中結實之處



餅上發之半時許待熱氣入內覺響即住復用枳實理中  
加附子或五積散之類服之治陰症冷結手足厥逆并發  
陰毒以汗出為度置三五餅易之○禽畜痞氣法蘿蔔子二  
合生姜二兩葱白七莖橘葉一握白麴半合共搗勻炒畧  
溫膏痞積之處外用著葉縮帛縛之候半日許胃中煩熱  
即解去拭淨復以熱手揉之不拘寒熱虛實遲早並用○  
製痞氣法用獨葉一太握麥麴半升同炒熱以皮紙襯綳  
包之乘熱發痞滿之處灸之灸至病人覺快方止凡  
痞氣初起施朴治後復原腹厚朴宜生一錢半厚朴三錢  
便食用之枳實二錢水煎溫服此即止治傷寒下後心煩腹滿坐  
卧不安方意必以山施之苦以吐虛煩枳實之苦以泄腹滿  
無腹滿者桂枝除動悸脈代甘草用炙桂枝甘草湯桂枝  
施肢湯效  
錢二分水煎溫服治過汗心悸欲按甚則胃滿虛而有嘔  
身振振欲擗地如豚代結者宜灸甘草湯  
施肢甘草生薑 施肢甘草湯山施四枚豆豉五錢甘草二  
錢水煎溫服治胃滿少氣熱傷氣也故加



其草於施鼓湯中以補氣○施鼓生薑湯施子四枚豆豉五錢生薑一兩水煎溫服治胃滿作嘔熱搏而氣逆也故

加生薑於施鼓湯中以散逆氣脇滿熱而有痰柴梗青皮杏核柴梗湯即小柴胡湯

六人參合枳梗湯治胃脘痞滿或痛○柴梗半夏湯柴胡一錢黃芩半夏枳殼桔梗各一錢杏仁各八

分半草四分水煎溫服治發熱咳嗽胃滿兩脇刺痛者此邪熱挾痰攻注也如口燥渴去半夏痰在脇下加白芥子

或竹瀝姜汁亦妙○柴陳湯即小柴胡湯合二陳湯治痰氣留脇不利及痰喘等症腹痛下寒黃連

乾姜性捷黃連湯黃連二錢乾姜桂枝各一錢人參一錢半半夏一錢二分甘草五分姜二片棗二枚水

煎溫服治胃中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者上熱下寒也方意以陽不得降而胃熱欲嘔陰不得升而下寒腹

痛是以用黃連之苦以降陽姜桂半夏之辛以升陰參草大棗之甘以益胃腹脹汗後厚朴半

夏功殊厚朴半夏甘參湯厚朴三錢半夏二錢人參一錢甘草五分姜二片水煎溫服治汗後腹脹滿而痛



方意以厚朴之苦瀉腹滿參草之甘益脾胃半夏生薑之辛散滯氣○桔梗半夏湯陳皮三味各等分姜煎溫服治

陰陽氣不和動氣衝心八味李根湯人當歸芍藥茯苓黃芩各二錢桂枝三

錢甘草半兩夏各一錢并李根白皮一兩水煎而腹脹胃滿霍亂多暑二

杏黃連散霍香厚朴半兩夏茯苓陳皮扁豆香茹各一錢

匙連服嘔多者倍之尤妙治伏暑霍亂暴作煩亂躁大便

燥而丸麻子麻子仁丸又各脾約丸大黃枳實厚朴芍藥

各五錢杏仁二錢每升丸溫湯下未利再服得快方止治小便數大便難

各為脾約宜此通腸潤燥方意以麻子杏仁之甘以緩脾

而消燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂液以苦泄之枳實太黃之苦下燥結而泄胃強也兼治年老

怯弱之人血燥風秘津液少大便堅及脚氣大便燥小便澀而對滑瞿萬全木通散



茯苓前葉各一兩瞿麥五錢為末每四錢水一盞煎至半  
盞溫服治陰虛為陽所乘膀胱中有積熱也故小便使難而

黃白通調冷利無脈煩躁加猪膽白通加猪膽汁湯附子二枚乾姜三錢葱白三

莖水煎去渣入車便二盞猪膽汁一校調服治少陰厥冷  
下利乾嘔脈不至而煩躁服此湯脈暴出者死微出者生

方意以腎主水客寒犯腎不能制水故厥逆下利是用葱  
白之辛以通腎之陽氣姜附之辛以散陰寒加重便膿汁

若內經所謂謂寒熱之逆冷熱並行不然熱物冷服下咽  
之後冷體既清熱性便發則病性不違而氣亦從可以去

拒格之寒也白頭踈熱利純下清水索黃龍白頭翁湯白頭翁黃柏秦皮黃連各

一錢水煎溫服治協熱下利後重而渴方意以腎欲堅急  
食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之○陶氏黃

龍湯本黃二錢芒硝一錢半枳實厚朴各一錢甘草人參  
當歸各五分年老氣血虛者去芒硝姜三片棗二枚枯梗

三分水煎一沸熱服治熱邪傳裏胃中燥糞結實心下硬  
痛純下清水多是此逐自飲藥水下利非外寒也宜急下



之身有熱者宜用此湯。桃花散石脂丸邪入經而膿。膿積

身無熱者六一順氣湯。桃花散赤石脂五錢半生半炒乾姜二錢糯米一合。

結塊水煎去渣入生石脂末一升調服。治少陰下利膿血。

腹痛小便不利下利不止。脉沈血寒凝滯下必紫黑成塊。

或雜膿血方意以石脂瀝腸胃乾姜散寒糯米補氣下焦。

裏寒不約者宜赤石脂丸。赤石脂乾姜各一兩黃連當。

歸各二兩為末蜜丸梧子大每升九米飲下。治小便澀太。

利阿膠湯。地榆散毒入臟而血新積流長。黃連阿膠湯山。

二錢水煎溫服。治傷寒熱毒攻胃流久太腸所下必紅赤。

成流如腹痛加芍藥血虛加芎歸血不止加地榆。夾膿有。

食積加山查神麴。地榆散地榆犀角黃連茜根黃芩各五錢山施二錢半為末每五錢入韭白五寸水煎溫服。治。

傷寒熱毒不解。晚即下。手足搐搦通末牛蒡。牛蒡根湯牛。

熱腹痛腰疼下利膿血。手足搐搦通末牛蒡。牛蒡根丁兩南。

星麻黃牛膝各六錢入酒一盞同於石器內搗細另按黃。

土地坑以炭火燒令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭。



少陰風邪，取黑龍取出為末，每一錢溫酒調服，治發汗。四股拘

急，易用人參服。古入竹湯，以參根五錢，竹茹二錢，半水煎，溫

及差後，勞復陰陽易病，外種疼痛，手足不能動者，溫經

益元，惕潤自愈。陶氏溫經，益元湯，熟地人參白朮黃芪其

三片，棗一枚，糯米一撮，水煎，服治汗後太虛，頭眩振振，

欲得地，非筋惕肉瞤及發汗太多，備虛亡陽，汗出不止，或

下後利不止，身疼等症，如飽悶，去地黃，加枳殼，變人去芍

藥，有熱去附子，泄利去歸地，加炒白朮，升麻，陳壁土，嘔加

姜汁，製半夏，夏渴加天花粉，汗後惡風，引風如聖，瘰癧可瘳

引風湯，太黃乾姜龍骨各四兩，桂枝三兩，甘草牡蠣各一

兩，凝水，石滑石赤石脂白石脂紫石英石羔各六兩，為粗

末，以薄布盛之，每取三指撮，水煎三沸，服治風溫，勞以火

熨發熱，則狀如驚，瘰癧時發，瘰癧瘰癧，如聖餅子，防風天麻



半夏各五錢南星乾姜川烏各二兩川芎甘草各二兩  
方有細辛三錢為末蒸餅丸艾實大捻作餅子日乾每五餅同荊芥三五傳細嚼茶清任下如傷寒得汗尚餘頭痛者姜葱煎湯下兼治男婦氣厥上盛下虛痰飲及風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆惡心目眩耳聾常服清頭目消風痰暖胃氣○陶氏如聖飲羌活防風川芎白芷柴胡芍藥甘草當歸烏藥半夏黃芩姜二片水煎臨熟入竹瀝姜汁調服兼治瘧症如柔瘧加白木桂枝剛瘧加麻黃蒼朮口噤咬牙大**安蛔理中**去甘草烏梅九子頻入口便實者加大黃利之

**安蛔理中湯**人參白朮乾姜茯苓各一錢半烏梅二箇水煎溫服治蛔厥如太便秘加大黃人蜜以利之口渴加瓜蒌根○烏梅九烏梅十箇乾姜一錢黃連一錢半細辛附子桂枝人參黃柏各六分當歸川椒各四分為末用醋半盞浸烏梅蒸爛去核和諸藥為丸梧子大每十九丸米飲下日三服病甚者多服中效為度忌生冷滑物治臟寒蛔厥得食即嘔乍靜乍煩兼止久利方意以烏梅之酸而斂肺氣人參之甘以緩脾氣當歸微和桂枝之辛以潤內寒姜



附之辛熱以勝內寒連柏之苦以安蛔凡虫症忌用甘草蓋虫聞其則起聞酸則止聞苦則定聞辣則頭伏而下若

治蜜桃仁與犀角雄黃銳散納肛頭治蜜桃仁湯桃仁枳

七枚水一盞煎至半盞瀝清溫服治狐惑唇上生瘡聲啞

黃連犀角湯黃連一錢半犀角一錢烏梅三箇木香一

分煎服同上治狐惑咽乾唇焦口燥熱盛雄黃銳散雄

黃青箱子苦參黃連各二錢半桃仁一錢為末生艾搗付

和如小指尖大懸懸納下部肛門消斑青黛紫雪猪膽鷄

內治狐惑症虫食上下若並宜

子仍飲肌參生地山施犀角青黛人參太便實者去參加

大黃姜丁片棗二枚水煎臨熟入苦酒一匙調服治熱毒

發斑等症紫雪升麻六錢黃金十兩寒水石石羔各四

兩八錢犀角粉半角各一兩玄參一兩六錢防香木香丁

香各五錢甘草八錢水五盞先煮黃金至三盞入諸藥并

煎至一盞去渣入芒硝三兩二錢慢火煎以柳木攪不停

手候欲凝入磁盆中更下硃砂麝香末各二分急攪令勻



候冷凝結成雪每一錢細細燕之治發斑咽痛及暑中三  
陽脚氣煩躁猪膽鷄子湯猪膽汁二合鷄子一枚苦酒  
三合和勻壯人煎三沸盡服藥人煎六七沸出赤斑黑膏黃連  
沸緩服汗出即愈治傷寒五六日斑出

葛根橘皮兼止嘔

黑膏生地二兩六錢半淡草豉一兩六錢半猪脂十兩和勻露一宿煎之令三分減一憑去查入雄黃末五分麝香末一分攪勻分作三服白湯化下毒從皮膚中出則愈未効再服忌蕪荑治溫

毒發斑嘔逆黃連橘皮湯黃連二錢麻黃葛根各一錢半橘皮杏仁枳實厚朴各一錢甘草七分水煎溫服治溫

毒發斑皮膚癰疹及唇口下部生瘡逆悶亂下利嘔吐清沈如病勢沉重晝夜呻吟不安或咽痛者去麻黃加玄

參升麻葛根橘皮湯葛根橘皮杏仁知母麻黃黃芩甘草水煎溫服治溫毒發斑心煩大青四物湯

治斑火紅大青一兩阿膠二錢甘草一錢香豉一合水煎溫服治壯熱煩躁木渴脉洪盛遍身斑出如火

色芒硝三錢塗斑爛是芒硝猪膽汁法芒硝三錢為末猪膽汁調塗瘡上候乾即落無痕

八門卷二



仍研朱粉之此病弱隨有如狂活血當歸桂苓飲子也相

應陶氏當歸活血湯當歸赤芍甘草紅花桂心乾姜枳壳

生地黃人參紫胡桃仁姜丁片煎入酒三匙調服服三

帖後去桃姜紅花加白木茯苓治無頭疼無惡寒但身熱

發渴潤利便黑口出無倫不可誤為熱症乃瘀血內傳心

脾二經使入昏迷沈重如見祟症名挾血陶氏桂苓飲

猪苓澤瀉桂枝甘草白木黃柏知母山桅蘼葉姜三片煎

再加滑石末一錢煎三沸服取微汗為効治初得病無熱

狂言煩躁不安精采不與人相當誤為發狂下者死殊不

知熱結膀胱名曰如狂在症血自下

者愈不愈者宜此古方用桂枝湯發狂三黃石羔桅子玄

明皆不又三黃石羔湯黃芩黃連黃柏山桅各二錢麻黃

溫服得汗即瘥未効再服治傷寒身熱煩躁不得汗脉洪

大四五日便發狂者表裏俱熱也○桅子仁湯山桅赤芍

大青知母各一錢升麻黃芩石羔杏仁各二錢紫胡一錢

半甘草五分香豉百粒姜三片水煎分二服治發狂煩躁



面赤咽痛潮熱百節疼痛○王氏玄明粉玄明粉二錢寒  
水石黃連各一錢半珍珠辰砂各一錢爲末鷄子清一枚  
白蜜一匙新汲水調服治發狂神効○水漬法用青布五  
六尺疊摺以新汲水浸之稍拭乾搭於病人背上須臾蒸  
熱再浸再搭良久狂定方可診脈下藥治大熱狂斗奔走  
不能制伏○火劫法用炭火一盆置病人之前將醋一碗  
急沃火內使烟氣衝入鼻孔內梔子烏梅湯瘥後不睡卽  
須臾自定或用凉水噴面亦可

**安**

施子黃芩甘草各一錢柴胡二錢烏梅一箇姜三片淡  
竹葉十四片豆豉一錢半水煎溫服治傷寒瘥後不眠

者此熱氣與陽并  
陰氣未復故也

**酸棗仁湯**晝夜不眠

堪救各一錢半石

黃二錢半茯苓知母甘草各一錢桂心五分姜  
三片鹽臥水煎溫服治汗吐下後晝夜不眠

陰症輕者

**三白辛黃以疎表**

辛黃三白湯人參白朮白芍各一錢白  
茯苓當歸五分細辛麻黃各二分姜三片

棗一枚水煎溫服治陰症傷寒在表如脈沈發  
熱口和加附子五臟見症加藥同麻黃湯見後

陰症重者



四順通脉以濟危

四順湯丸人參白朮乾姜各二錢甘草

三錢水煎或蜜丸服治身無熱脉沈苦

煩默默不欲見死腹痛下利或無味可診未辨陰陽姑與

服之若是陽厥便當見出熱症若是陰厥則無有熱矣○

通脉四逆湯附子五錢乾姜二錢半甘草二錢葱白三莖

面赤者七莖水煎溫服治少陰症下利清穀微熱厥逆反

不寒者面赤脉微欲絕或咽夜乾嘔腹痛自利不止如腹

痛去葱加芍藥以利氣嘔加姜汁以散之利止脉不出加

人參以補血咽痛加桔梗以散結○茯苓四逆湯茯苓乾

姜甘草各一錢附子人參各三錢水煎溫服治發汗復下

後不解脉沈微而細煩躁者陰陽俱虛也方陽毒升麻玄

意以四逆湯以復陽加入參茯苓以益陰

參狂斑頰愈

陽毒升麻湯升麻射干人參各一錢黃芩二

錢犀角一錢半甘草七分水煎溫服取汗治

陽毒發斑頭項背痛躁悶不安狂走妄罵下利咽喉腫痛

口吐膿血○玄參升麻湯甘草三味各三錢水煎溫服治

發斑煩躁譫語陰毒正陽甘草厥痛立移正陽散附子一

咽喉閉塞腫痛



錢皂莢一挺麝香二分爲末每一錢水煎入蜜熱服治陰  
毒額汗頭痛面青舌黑口張出氣煩渴心忤硬滿肢厥身  
冷多嘔○陰毒甘草湯甘草升麻當歸桂枝各一錢黃  
川椒各一錢半煎甲三錢水煎溫服良久再服毒當從汗  
出未汗再服治陰毒畏寒身體重痛腹疼背強咽痛嘔逆  
恍惚失驚氣短神昏小甲青黑手足冷汗頭面烘熱等症  
**破結瀉毒活龍散**用蜜調下破結丹辰砂青礞石葶蘇肉

巴豆各五錢輕粉半分麝香五分金箔五片爲末用米醋  
半盞入辰砂附子牽牛三味熬成膏次入餘藥和九皂子  
大輕粉爲衣每二九蜜湯下治陰陽伏逆變爲結胃五六  
日太便秘攻之不可達之不及以訖止之○活龍散活地  
龍四條洗淨研爛入姜汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲  
水調和徐徐灌盡漸次涼快若熱熾者加片腦少許未効  
再服自然汗出而解治陽毒累經藥下不通  
結胃硬痛或稍通而復再結喘促熱燥狂亂  
**陽丹宜酒投之**返陰丹硫黃五兩硝石太陰玄精石各二  
兩乾姜附子桂心各五錢爲末用鐵銚元



鋪玄精次鋪硝石各一半中間鋪硫黃末又將硝石玄精  
餘末蓋上以小盞合着用火三斤燒令得所勿令煙出急  
取瓦盆合着地上四面灰蓋勿令煙出候冷取出入餘藥  
同為末和九梧子大每升丸艾湯頓下汗出為度治陰毒  
心煩口痛肢冷面青腹脹脈伏及氣虛陽脫無脈不省人  
事傷寒陰厥○復陽丹葶藶加木香乾蝎附子硫黃吳萸  
名五錢乾姜一錢為末酒糊丸梧子大每升丸姜湯下  
夜以熱酒投之取汗治傷寒面青肢冷心腹脹脈沈細陽  
盛拒陰陶氏三黃巨勝湯可切陶氏三黃石羔湯去麻黃巨  
枚水煎臨熟入泥漿清水二匙調服治陽毒發斑狂亂妄  
言大渴叫喊目赤脉數大便燥實上氣喘急舌卷囊縮難  
治姑以此  
湯劫之陰躁回陽百問霍亂散尤奇陶氏回陽返本湯  
人參麥門冬五味子臘茶陳皮如面戴陽者加葱白七莖  
黃連少許清泥漿二盞煎臨熟入蜜五匙頓冷服之取汗  
為効治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤欲坐井地脉無力  
欲絕○百問方硫黃五錢艾湯調服即時安卧良久睡起



汗出而愈治傷寒身冷脉微手足厥而躁○又方附子五錢生薑三錢需米一撮水一大盞煎至六分溫服取汗切不與冷水飲之如發渴併查服之甚效治陰毒傷寒煩躁渴悶心震震散附子一枚炮過取出用冷灰埋半時切半枚入真臘茶一錢水一盞煎六分去渣入熟蜜半匙調勻頓吞服之須臾躁止得睡汗出乃瘥治陰盛格陽身冷反躁欲投井中肢體沉重唇青面黑渴飲水復止大便自利黑水六脉沈細而疾或無瘥後水腫壯

牻澤瀉湯以利便各等分爲末每方寸匕白湯調服小便

得利即止治大病瘥後從腰以下水腫方意以壯牻澤瀉海藻之鹹以瀉水氣漆亭瓜商之辛酸苦以導濕腫瘥

後神昏氏導赤各半湯以醒迷黃芩黃連甘草犀角麥門冬滑石山桅茯神知母人

參桑棗煎加燈心一握煎沸熱服治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則熱不與則不思形如醉人乃熱傳手少陰心也心火上逼肺所以神昏名越經



症易病燒裊赤衣與鼠糞虛弱乎當歸白朮

燒裊散取近陰處裊襠一

塊方六四五寸男用女裊女用男裊燒存性溫水調服方寸匕日三服一方加手足指瓜甘片燒灰男女互用米飲

下小便即利陰頭微腫則愈○赤衣散取室女月經布近陰處者燒灰白湯調下或入湯藥調服尤妙男女俱宜○

猥鼠糞湯非白一把雄鼠糞十四枚水煎溫服微汗未汗再服治男子陰易小腹連腰跨急痛○當歸白朮湯當歸

附子各二錢生姜一錢白朮桂枝甘草以參黃芪芍藥各五分水三盞煎至一盞溫服食頃再進一服微汗便瘥治

男婦病未平復因犯房事則小腹急痛連腰膝四肢不能舉任身無熱者復症枳實黃與鼠

屎道造乎人參竹皮

枳實湯山枳實各一錢香豉五錢水煎服微汗治勞復發熱方意

以熱聚於上以苦吐之熱散於表以苦發之經曰火淫所勝苦以發之是也○枳實黃湯山枳實柴胡各一錢

香豉五錢大黃三錢人壯積堅者五錢水煎溫服治食復

發熱如內熱加黃芩腹脹加厚朴傷肉加山查傷麪飯加



神麴○鼠屎敗湯鼠糞七枚枳壳一枚山柘七箇且敗丹  
粒葱白廿莖水煎溫服治勞復發熱○人參逍遙散人參  
當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍白茯苓各一錢水煎溫  
服治女勞復虛弱若如心煩口乾加麥門冬五味子陰虛  
火動精泄加知母黃柏牡蠣心下痞滿加黃連枳實不眠  
加竹茹煎服○竹皮逍遙散青竹皮郊縮腹痛者倍之人  
參知母黃連甘草滑石生地非白柴胡犀角各二錢棗二  
枚煎臨服入燒裨糯米一錢半調服微汗未汗再服得小  
便利陰頭腫即愈  
治勞復及易病  
**百合分汗吐下**陶氏柴胡兼用合知母  
湯百合七枚知母一兩先以水洗百合漬一宿去白沫另  
以水二盞煎至一盞去渣又以知母水二盞煎至一盞去  
渣二汁和勻再煎至一盞半分二次溫服○吐後百合鷄  
子湯百合七枚製法如前煎汁一盞入鷄子黃一枚攪勻  
溫服○下後百合滑精湯百合七枚製煎法如前另用泉  
水二盞煎滑石二兩代赭石一兩至一盞方入百合汁內  
再煎至一盞溫服○不經汗吐下者百合地黃湯百合七  
枚製煎法如前更用生地二兩搗汁一盞和百合汁再煎



至一盞溫服大便當下如漆中病即止。○變成渴者百合洗法百合一升以水十盞漬一宿通身洗之洗已淡食將息弗與鹽豉。○渴而不瘥者瓜蒌牡蠣散瓜蒌根牡蠣各等分為末每二錢白湯調日三服。○變成發熱不休者百合滑石散百合炙一兩滑石三兩為末每三錢白湯下。○陶氏柴胡百合湯柴胡人參黃芩甘草知母百合生地陳皮姜三片棗一枚入醋炙驚甲煎溫服治瘥後昏沉發熱渴而錯語失神及百合勞復等症如渴加天花粉即煩加山梔頭疼加羌活川芎嘔吐加姜汁製半夏胃中飽悶加枳梗食復加枳實黃連大便秘實加大黃虛煩加竹茹竹葉瘥後乾嘔錯語失神呻吟睡卧不安加黃連犀角玄喘加杏仁百合麻黃驚惕為血少加當歸茯神遠志虛汗加黃芪脾卷加白朮腹中雷鳴加煨生姜勞復時熱不除加葶藶烏梅生艾法不仁因汗過多駱龍升麻湯獨宜升麻秦艽連翹芍藥防風薏苡仁枳壳各一錢木香五分姜五片水煎溫服治傷寒肌肉頑麻不仁壞症表以知母麻黃而參胡芍藥清肌熱麻黃不痛不痒



湯知母二錢麻黃甘草芍藥黃芩各一錢桂枝五分水煎  
溫服微汗即愈治汗吐下溫針不辭及小柴症罷而熱尚  
在者亦為壞症大率以表症多者宜用○參胡芍藥湯人  
參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢生地一錢半枳壳  
八分身草三分姜三片水煎溫服治傷寒十四日外餘熱  
未除脉息未緩大便不快小便黃赤或渴或煩不能安睡  
不思飲食此邪氣未淨正氣未復當量其虛實以調之如  
渴加竹茹血弱加當歸虛煩加竹葉梗米二便自利胃  
腹不飽形羸脉弱去枳壳倍人參不睡加炒酸棗仁茯神  
宿糞未淨腹滿或夜便硬不通量加太黃壞症久則驚甲犀角而參胡溫膽止  
痰涎驚甲散驚甲犀角前胡生地黃芩各一錢枳壳八分  
烏梅二箇水煎溫服治壞症諸藥不効○溫膽湯半  
夏枳實各一錢陳皮一錢茯苓五十分半甘草四分竹茹一  
兩姜七片棗一枚水煎熱服治傷寒瘧後一切虛煩不眠  
氣脉不和心膽虛怯及食復勞役病症如初如頭眩身搖  
加白朮咽痛加桔梗百脈加菖蒲由人○參胡溫膽湯陳皮



半夏茯苓枳實人參各一錢竹茹香附麥門冬柴胡桔梗  
各八分甘草三分姜三片棗二枚水煎溫服治心膽虛怯  
觸事易驚夢寐不安氣鬱生痰變生諸症或短氣  
營之或復自汗四肢浮腫飲食無味煩躁不安婦人熱  
入血室桂紅海蛤堪調和桂枝紅花湯桂枝赤芍甘草各  
枝水煎溫服汗出而解治傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥  
舌乾經脈凝滯不得往來海蛤散蛤粉滑石甘草各二  
兩芒硝二兩為末每二錢鷄子清調下治傷寒血  
結胃痛不可近服此小腸利而腹中血自散矣寒犯產

家黃龍增損可通用

黃龍湯柴胡黃芩人參各二錢甘草  
二錢水煎服治胎前產後及經水適

來適斷傷風傷寒表症半表裏症及汗後嘔後勞復餘熱  
氣壅合四君子湯血虛合古芍歸湯表邪將欲傳裏幾至

動胎者加阿膠倍芥木

產前表以前胡芍蘇入裏柴壳罩胎兒

前胡七物

湯前胡黃芩山梔知母各一錢石羔大青各二錢竹茹一  
彈入葱白煎服治孕婦傷寒頭疼壯熱肢節煩疼○芍蘇



故川芎陳皮芍藥白朮各八分蘇葉六分乾薑五分黃芩  
前胡麥門冬各一錢甘草三分姜葱煎服治孕婦傷寒寒  
熱頭疼身痛項背強加減由人如傷風咳嗽寒熱痰喘不  
服以參蘇飲去參加本木瓜萎杏仁最妙○柴胡枳殼湯  
柴胡一錢半枳殼黃芩山梔知母麥門冬乾薑各一錢六  
青生地石羔各二錢升麻八分甘草四分水煎溫服治孕  
婦傷寒邪傳於裏口渴煩熱腹滿便閉譫語或發斑晝夜  
不寧如大便閉甚量加大黃○柴胡石羔湯柴胡二錢石羔  
四錢甘草一錢姜煎服治孕婦傷暑惡寒頭痛壯熱躁悶  
四肢煩疼背項拘急口乾舌燥如氣虛加人參○秦艽散  
秦艽柴胡石羔前胡赤茯苓甘草犀角升麻乾葛黃芩各  
等分竹茹減半姜煎入姜汁調服治孕婦時氣五六日不  
得汗口渴狂言嘔逆○蘆根湯蘆根二錢麥門冬一錢半  
人參乾葛知母各一錢竹茹一彈丸葱白煎服治孕婦執  
病頭疼壯熱嘔吐食不下心煩○梔子大青湯梔子大青  
黃芩各一錢半升麻一錢杏仁八分葱白煎服治孕婦傷  
寒發熱變黑或尿血○蘇木湯蘇木枳殼陳皮黃芩黃連  
各一錢甘草四分水煎服取汗治孕婦傷寒或中時行疫



癘淋淋作寒慄而悸○單胎散嫩捲荷葉一兩焙蛤粉五錢為末每服一錢蜜水調服治孕婦傷寒太熱悶亂燥渴或發痘疹惡產後表以柴胡防歸近裏旋竹破瘀蘊柴胡防傷胎臟

胡人參各一錢當歸三錢川芎一錢半半夏陳皮防風各八分甘草五分姜棗煎服治產後發熱不因難產傷乃及

亡血過多惡露未盡無子蒸乳四症果係外感風寒表症脉實挾食積瘀血量體加減○旋覆花湯旋覆花赤芍前

胡半夏快本麻黃杏仁各一錢五味子十四粒甘草五分姜煎服治產後傷風寒暑咳喘痰盛坐卧不安○竹葉防

風湯淡竹葉廿四片防風人參桂枝桔梗前胡陳皮茯苓各一錢姜棗煎服治產後傷風發熱頭疼面赤氣喘○柴

胡破瘀湯柴胡黃芩半夏甘草赤芍當歸生地各等分五靈脂桃仁各減半姜煎服治蓄血症及熱入血室如大便

閉加大黃一兩然非汗下暫爾從權孕婦傷寒雖久月忌用麻桂芒黃表急者

蘇葱白陳散厚朴枳實消導萬不得已暫用汗下即宜古



安胎產後補然後用藥療傷寒病稍退時藥即去又云氣口緊盛下為宜人迎緊盛汗乃是左寸關脈若浮緊當救血室和榮衛只宜發汗不宜下汗則液通病去矣但傷寒藥皆不必盡劑與雜病不同和補與男相

共婦人傷寒傳經直中及諸類症雜症與男子相同但胎前陰症只宜理中湯加芩歸暫服不可用烏附犯胎其餘和鮮之劑量病多服以平為期抑論辛甘需養氣分假之以發散桂枝

升草之類能復陽氣凡傷寒發散藥多用東棗煎者以其能和藥也惟中滿嘔吐者不宜酸苦忌姜血

分賴之以湧泄能補陰血歟津益榮故不用姜山梔無故

吐不宜麻黃無葱汗不發大黃非枳實不通附子無姜不

熱竹瀝非姜汁何以行經蜜導非皂角何以通結利藥不

難生尤便於清肌補湯須用熟最宜於養血主乎病者先



煎病在下者早發詳見本草吁與其方多而効少莫若方少

而意深疾各有因通於彼者塞於此即如傷寒初症其人素有食積痰火及素

虛素實或酒後房室後或惱怒後各各不同如此豈可執一試効之方而均治彼此之疾乎藥不可執

宜於古者泥於今古人治病之方雖存而其受病之因豈能知其悉乎况古今風氣不同人情亦

異即如男女之慾古人一二十歲而後動今纔十四五而真元已漏矣若謂無古今之異則是三代之禮至今可盡

行矣其不可改者表裏虛實之法寒熱溫涼之性耳許氏謂讀仲景書須守仲景法得仲景心不泥仲景方者是也

陶氏所立三十六方似於傷寒加一瘧癘然然古法已湮亦正欠此一番活動故倫載之症自我識方

自我立草木鳥獸資於學固有讀醫書而不知醫者未有不讀醫書而知醫者也神

明變化存乎心四太家之書既理會又能通於儒而後可以神明變化故曰不知易者不可以言醫



汗吐下瀲和解溫補總方

陽症

○ 大汗

寒氣入人肌膚久則侵骨頭痛如劈身熱如火浮熱甚者俱宜午時前發汗午後陰分不宜故日汗不太早汗不厭早緊急不拘晝夜以衣被覆首畏足向火服藥緩緩得汗令手足濕遍為佳如難汗將查再服或汗後不解又可再汗若急汗如水淋瀝則病邪不除而真陽脫亡丸散亦可發汗不如湯藥為發

麻黃湯

治太陽症頭疼發熱惡寒脊強身痛無汗脉浮緊而喘又治太陽八九日不解以此發汗必解乃解及不得汗發喘又治太陽陽明合病喘而胃滿腹不滿邪在表分不可下者又治陽明脉浮無汗而喘凡脉但浮無餘症者皆宜服之



麻黃

錢三

桂枝

錢二

杏仁

十粒

甘草

六分

姜三片

葱二莖

水煎

中病即止不必盡劑如感寒深重服湯不得汗宜再服之半日連進二三劑而汗不出者死方意以寒傷榮則榮盛而衛虛榮脈中寒邪盛則血脈滯而頭項背腰強痛是用桂杏之辛其以散之衛虛則惡寒無汗氣逆而喘宜麻黃甘草之甘以大發之充其衛分之陽或疑無汗用桂枝者蓋榮行脈中并衛氣而犯之經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛又曰辛甘發散為陽凡寒淫者甘此例也

陶氏麻黃湯

即前方加

升麻

川芎

自芷

防風

羌活

藁本

本姜

無汗而喘去升麻加葛根

本經寒熱身痛去杏仁加蒼

朮芍藥本經寒熱身痒面赤不得小汗者去杏芷升麻加柴胡芍藥本經寒熱頭痛胃中飽悶加枳殼桔梗凡陶氏方原無等分以意酌量可也○活人大全云太陽症脉浮無汗當以急汗麻黃湯主之肝之表見症若加防風羌活心之表見症若加黃芩石膏脾之表見症若



加防己白朮肺之表見症者加桂枝  
生薑腎之表見症者加熟附子生薑

### 追魂湯

治卒厥暴死及客忤鬼擊飛尸奄忽氣絕口噤麻黃三錢杏仁七粒甘草二錢水煎欬口灌服若

更不下分病人髮左右提頸肩引之藥下漸甦一方有桂枝二錢服後身和汗出則愈若入臟唇青身冷即死

### 三拗湯

治感冒風邪寒冷鼻塞聲重語音不出咳嗽多痰前溫服得汗為度如骨緊加枳實

有痰加半夏頭痛加石膏細茶

### 五拗湯

即前方加荆芥桔梗等分如咽痛甚者臨服入芒硝少許下方去荆芥桔梗用枳實半夏

### 麻黃附子細辛湯

麻黃細辛各二錢熟附片一枚水煎服取汗至足

乃愈如嘔吐去熟辛倍生薑方意以傷寒無熱惡寒者陰盛病也今少陰病始得之當無熱而反發熱但頭不痛身重耳乃邪在表也麻雖沈以益得邪氣未深尤當溫發汗以散之是用附子細辛之辛以溫少陰之經



麻黃之甘以散少陰之寒經曰寒淫於內治以甘熱  
以苦辛以辛潤之是也凡房慾後傷寒者多患此症  
活人大全云少陰症脉沈欲寐始得之發熱肢厥無汗  
為表病裏和當以此湯緩以汗之隨各臟見症加藥同  
麻黃湯若少陰外顯前症內見二便閉澀或瀉赤水謂  
之有表復有裏宜本方去麻黃名附子細辛湯隨各臟  
見症加藥同麻黃湯但  
更加大黃以微和之

### 麻黃附子甘草湯

治少陰病得之二三日發熱脉沈細邪  
猶在表無吐利厥逆諸裏症宜此湯微

汗以緩散之即前方去細辛加甘草二錢煎服  
凡方以麻黃為主者皆自麻黃湯而變之也

### 解肌

微汗也風傷衛衛強則榮弱故以清榮不可  
大汗傷血須半空心時密坐加衣靜坐宜熱

服藥得粘  
汗即止

### 桂枝湯

治太陽傷風衛實榮虛自汗頭痛鼻鳴頭強乾嘔  
發惡寒渴法惡風翁翁發熱或熱多寒少面色光



而不像煩躁身痛手足不冷脈浮緩寸大尺弱者宜如  
無汗溺數手足冷不惡寒者忌用夏月誤服麻桂必發  
黃發斑狂悶而死

桂枝三白芍

錢三甘草

一錢姜三片棗二枚水煎熱服微

衛脈外風邪盛則發熱自汗氣逆鼻鳴乾嘔宜桂姜之  
辛以散之榮虛宜惡寒而又惡風者因自汗腠理疎也  
宜芍藥之酸以斂之衛盛榮虛則爭為寒熱故用甘棗  
之甘以和之經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以辛  
散之以酸收之以甘緩之是也或問傷寒論云陽虛陰  
盛汗之則愈下之則死又云桂枝下咽陽盛則斃桂枝  
包麻黃而言然則桂枝亦發汗藥乎蓋表陽虛而後風  
邪得以乘之客於榮衛之中榮衛亦屬皮毛表分也非  
發散何由待愈且桂枝雖能止汗亦能和血而入之汗自  
出也對內桂而言實為發汗藥麻黃而言則為止汗要  
之麻桂皆表藥也一則大汗一則解肌但有汗  
不得用麻黃無汗不得用桂枝實仲景格言也



陶氏桂枝湯

即前方加防風川芎羌活藥本姜棗煎服熟入飴糖二匙溫服治法同前如汗多加白朮

汗不止加黃芪喘加柴胡杏仁胃中飽悶加枳梗○入大全云太陽表症外見復有裏症便閉瀉腹痛或偏赤水瀉之有表復有裏桂枝湯主之隨各臟見症加藥同麻黃湯但更加大黃以微利之

○附六經傷風方

太陽桂枝湯少陽柴胡桂枝湯太陰桂枝加芍藥湯

杏子湯

治足陽明傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒自汗喘目身重惡熱潮熱而嘔脈浮弦數桂枝

芍藥甘草細辛乾姜木黃各六分杏仁半夏五味子各七分茯苓八分水煎溫服

九味桂附湯

治足少陰傷風胃滿心煩咽痛自汗腰連胛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛脈沉而弦桂枝芍藥

甘草乾姜生附茯苓桃仁各五分

水煎溫服如咽痛加桔梗二分半

八物散

治足厥陰傷風惡風而倦自汗小腹急痛寒熱如瘧骨節煩疼脈尺寸俱微而遲桂枝當歸川芎前



胡防風各三分芍藥一錢半甘草炙各五分  
姜五片棗二枚水煎溫服方論見傷風條下

**葛根湯**

治太陽陽明無汗惡風發熱惡寒頭痛項背腰強  
目痛鼻乾不眠肢體拘急骨節煩疼胃脘滿悶不  
問下切傷寒溫病時行寒  
疫等症兼治剛柔二症

葛根三錢麻黃二錢

芍藥一錢

桂枝一錢甘草

八分姜二片棗  
二枚水煎溫服

取汗本草云輕可去實故加麻葛二味之輕於桂枝湯  
止以去表實甚有意味麻黃治太陽葛根治陽明所謂  
治陽明而不可  
棄太陽是也

**葛根解肌湯**

即葛根湯加黃芩二錢治同上  
兼治春疫發熱而渴不惡寒

**陶氏解肌湯**

即葛根解肌湯去麻桂加柴胡羌活白芷桔  
梗石羔升麻姜煎服治陽明病兼傳少陽等

症如無汗惡寒甚者去  
芩加麻黃夏秋換蘇葉



外麻葛根湯

治四時傷寒時行疫癘表症或已汗吐下表症未解熱深毒甚發為斑疹春溫尤妙兼治

小兒瘡疹欲發未發及解傷酒隔熱口瘡咽痛葛根錢半升麻芍藥甘草各一錢水煎溫服以病去身清涼為度如表熱加柴胡內熱加黃芩有吐血衄血或斑紫赤加生地牡丹皮熱甚加山梔黃連或加連翹天花粉尤妙大便硬加枳殼大黃以利之頭痛加川芎身痛加羌活身關節痛加桂枝咳嗽加杏仁有痰加半夏發斑加玄參如老人去芍藥加柴胡茯苓人參

柴胡升麻湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽涕唾稠黏葛根芍藥柴胡前胡荆

芥石羔各一錢桑白皮黃芩各六分升麻五分姜三片豆豉十粒水煎溫服凡方以桂枝芍藥為主者皆自桂枝湯而變之也

九味羌活湯

不問傷風傷寒寒熱頭項脊腰四肢強痛并四時感冒疫癘晚發等症雜病亦可通治此



方不犯三陽經  
禁解利神方

羌活

一錢半治太陽肢節痛為君大無不通防風半治

少陽一身盡痛隨作使而引蒼朮一錢二分雄壯止行

之如有汗者倍防風減羌活大能除濕使邪氣不

傳太陰如有

汗者換白朮川芎一錢三分治厥白芷一錢二分治陽

細辛三分治少陰若黃芩一錢二分治太

陰心熱有熱者可甘草五分能緩裏和中述各藥主治

用無熱者去之放葱白二莖水煎熱服取汗如無汗用熱粥以助之此

方發春夏秋三時表症代桂枝府黃青龍各半四方蓋

三時暄熱傷寒則不敢用冬月麻黃而發表故代以羌

活蒼朮傷風則不敢用冬月桂枝而實表故代以防風

白朮芳芷辛發表以代杏仁並黃救血以代芍藥加黃

芩以順天時也○加減法太陽症加羌活藥本陽明症



加升麻葛根白芷少陽症加柴胡黃芩半夏太陰症加  
蒼朮厚朴枳實少陰症加桔梗知母黃柏葶陰症加川  
芎柴胡如夏月加石膏知母服此湯後不作汗加蘇葉  
惡風自汗加桂枝夏月去桂加芍藥汗後不解加大黃  
嘔逆加姜汁有痰去地黃加半夏肌熱加柴胡葛根隨  
而惡寒身熱加杏仁生地虛煩加知母麥門冬竹茹  
中飽悶加枳殼桔梗中風行經加附子便閉加大黃中  
風兼五痺等症各隨十二經內外上下寒熱溫涼四時  
六氣加減補瀉用  
之煉蜜為丸尤妙

羌活中和湯

治傷寒無汗脈浮緊羌活蒼朮各一錢半防

風水黃芩川芎白芷生地甘草各一錢細辛五  
分水煎熱服取汗如渴加知母石  
羔瀝土司天倍蒼朮又兩亦加

防風中和湯

治傷風有汗脈浮緩防風白朮半地各一錢  
半羌活黃芩白芷甘草各一錢川芎五分水

煎溫服汗不止加黃芪芍  
藥仍不止用柴胡桂枝湯



川芎湯

治犯房室感寒頭痛發熱惡寒無汗脉浮緊川芎白朮羌活各等分水煎熱服

吐

凡胃中痰實熱鬱或寒結胃中鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾或下利寸口脉滑或宿食在上或客氣胃中脉結心下煩滿而不能食者並宜吐之一服中病即止不可過也凡吐之時先以布繫腰腹於無風處空心或半空心時得天氣清朗為妙如風痰急病及傷食者不拘以吐為度如不吐含砂糖一塊下藥涎出不損人此皆自吐之法不用手探但藥但湯皆可吐雖雜病但宜升提其氣便吐通用防風山梔川芎桔梗蘆人參蘆茶芽生薑非汁之類加入二陳湯中吐之妙也

瓜蒂散

治寒邪不在表亦不在裏而在胃中半表之分故症如桂枝但頭不疼項不強寸脉微浮或大胃中

痞鞭痰涎壅盛氣上衝咽不得息或懷懊煩躁不得眠不汗下謂之實煩宜用如諸亡血及諸虛家不可用



瓜蒂赤小豆

各五分為末用豆豉煎湯調服或以鹽湯

良久用指探之隨吐得快乃止如不止飲熱湯一碗以助藥力如服藥過多者飲水解之未吐次日又服之

梔鼓湯

治太陰病在胃脘脉大身發熱及汗吐下後虛煩發躁不得眠甚則反覆顛倒心中懊憹及身熱不去

心中結痛或按之軟者又治陽明症下後外有熱手足溫不結胸心中懊憹饑而不食但頭汗等症

山梔豆豉

六錢水煎服得吐即止經曰酸苦湧泄為陰其高者越之胃中痞鞭越以瓜豉之苦

在上者湧之痰涎壅盛湧以赤豆之酸但瓜蒂性猛不宜施之更妙施之之苦寒更入酸蘗水少許以吐胃中之邪如表熱加柴胡痞滿加黃連傷食加山查神麴便閉加大黃但病人微瀉者不可服裏虛而寒在下也經云先泄而後生他病者治其本必且調之後乃治其他治痰火於此而悟焉其神乎○凡方以梔子為主者皆自施鼓湯而變之也



下

凡下積聚，難征，須五鼓或平旦，且空心服藥，傷寒  
潮熱，不納飲食者，已時以後，大下好，故曰下無太  
晚。下不壓，晚難，病皆同，如不可通，用蜜導法，凡  
下藥，用湯，勝於水，淨萬物，故也。一服中，病即止，  
不必盡劑，通三五  
次，後以稀粥止之。

大承氣湯

治陽明病，脈實，身重，汗出不惡寒，譫語，煩躁，五  
六日不大便，脘腹脹滿，硬痛，煩渴而喘，手足心

并腹下澀澀，汗出少，陰口燥，咽乾，煩熱，胃熱，當消穀引  
飲，今久不食，者內必有燥屎，若能食者，但便硬耳，又  
脈滑而數者，有宿食，凡  
病太熱，太實，太滿者，宜

大黃厚朴芒硝枳實

各二錢半，水一斗，先煎枳實，分下大黃，煎三沸，去渣，下芒硝，

煎一二沸，溫服，得利即止，未利再服，其大黃須用酒洗，  
若生用峻下，則必為邪熱，於至高之分，是以愈後多患  
頭目等疾，活人大全云：裏症，脈沉宜急下，若大承氣  
湯主之，肝之裏見症者，加柴胡，黃芩，心之裏見症者，加



黃連交門冬脾之裏見症者加白芍生地肺之裏見症者加黃芩石羔腎之裏見症者加知母黃柏

### 小承氣湯

治裏症曰見三四時腹脹滿而不甚堅硬或胃滿潮熱不惡寒狂言而喘視其病之小熱小實

小滿者宜大黃五錢厚朴枳實各二錢煎服同前得利即止活人太全云裏症脈浮宜緩下者小承氣湯主之肝之裏見症者加柴胡連翹心之裏見症者加赤茯苓通脾之裏見症者加蒼根炒山施肺之裏見症者加連翹黃芩腎之裏見症者加滑石黃柏

### 調胃承氣湯

治傷寒二三日不解蒸蒸熱而不滿腹如仰弄腹中轉矢氣必有燥屎及太陽邪熱入於

陽明裏之裏故不惡寒反惡熱太便秘小便赤謔語而嘔日晡潮熱狂瑛煩亂脉來洪實者宜大黃四錢芒硝三錢甘草一錢煎服同前如發狂走竄者陰不足也宜加當歸經曰微者逆之順者從之是也○方意承者順也本草云通可去滯瀉可去壅塞而不利閉而不通可也湯將使正氣得以順暢是以承氣名之經曰燥淫所



勝以苦下之熱淫所勝治以鹹寒又曰燥淫於內治以  
苦溫是以三承氣湯宜分三焦受病而用之若三焦傷  
者痞滿燥實堅俱全是以大承氣湯用大黃枳實之苦  
泄滿實以條熱厚朴之苦溫消痞下氣芒硝之鹹寒潤  
燥軟堅上焦傷者有痞滿實而無燥堅是以小承氣湯  
用枳朴除痞滿大黃泄實熱不用芒硝因不甚燥恐傷  
下焦血分真陰謂不伐其根也中焦傷者無痞滿而有  
燥實堅是以調胃承氣湯用甘草和中芒硝潤燥大黃  
泄實不用枳朴恐  
傷上焦虛無之氣

### 三一承氣湯

治傷寒雜病內外所傷一切風熱風痰濕熱  
燥熱入裏之深大小便閉或產難死胎不下

小兒斑疹里陷等症即大承氣湯加甘草五錢生薑三  
片又能治肝經玉莖中痛故曰肝苦急急食甘以緩之  
故加甘草以調其中  
河澗得之於仲景也

### 陶氏六一順氣湯

治傷寒熱邪傳裏太便秘結實口燥咽乾  
怕熱譫語撮衣狂妄揚手擲足斑黃陽



厥潮熱自汗曾腹滿硬燒臍疼痛等症是以代大小調  
胃三一承氣大柴胡大陷胃等湯之神方也本黃枳實  
厚朴芒硝柴胡黃芩芍藥甘草煎法如前臨熟入鐵秀  
水三匙調服立效取鐵性沈重最能墜熱開結故也○  
凡本柴胡湯脾約丸生地芥連  
湯之類皆自承氣而變之也

○ 參 傷寒表症忌參惟熱  
近裏未可通利

猪苓湯 治陽明病上焦熱脉浮發熱中焦熱渴飲水下  
焦熱小便不利三焦俱熱宜使熱邪從小便出兼

治少陰按熱下利咳而嘔渴心煩不得眠先嘔後渴頭  
痛身痛胃燥及秋疫發黃等症惟汗多而渴者不可服

猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉 各一錢水煎去渣臨熟入阿  
膠煎洋溫服方意以茯苓之

其以行小便使澤瀉之鹹以瀉伏  
水滑石阿膠之滑以利水道

五苓散 治大陽病初起無熱但狂言煩躁不安滑米與人下  
相當及汗後胃中乾燥不得眠尿赤微煩作渴惟多



上焦微煩邪猶在表惟渴則入裏熱未成實不能消水  
停蓄不散或傷寒下早心下痞滿不痛或太陽少陽同  
病及中暈霍亂煩躁中濕關節疼  
痛濕痺小便不利太便反快等症

猪苓茯苓白朮澤瀉

各一錢半

肉桂

五分

為末

每二錢

白湯

調服生津液和表裏如

無熱煩躁狂言者服後以指探吐方意以傷寒發熱而  
煩六七日不解脈浮者邪在表也或汗後亡津胃乾煩  
躁不眠不能食但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛躁  
或飲水不散而反吐出為水逆症或飲水雖多而小便  
不利者皆裏熱未實不能化水故耳是以用白朮茯苓  
猪苓之其潤而利津液澤瀉之鹹以瀉伏水肉桂  
之辛甘以和肌表經曰其甚反淡其緩而淡淡味滲  
泄為陽鹹味湧泄為陰辛甘發散為陽是也○加減法  
陽症去桂熱服令汗出即愈陰症加附子溫熱病加其  
草寒熱發黃加茵陳頭自痛加川芎葱白咳嗽加五味  
子熱吐加半夏熱瀉合小柴胡湯加黃連狂言亂語加  
辰砂小便閉加瞿麥滑石太便難加黃芩勞復加桂枝



水氣加<sup>六</sup>葶<sup>六</sup>藶發虛熱加<sup>六</sup>參芪麥門冬以分陰陽腹痛加<sup>六</sup>木香氣塊加<sup>六</sup>三稜莪朮鼻衄加<sup>六</sup>茅花尿血加<sup>六</sup>山梔身痛加<sup>六</sup>蒼朮煩躁去<sup>六</sup>桂加<sup>六</sup>入參心煩不眠加<sup>六</sup>阿膠

陶氏五苓散<sup>即五苓散用桂枝加甘草滑石山梔燈心鹽熟入鹽一字調服如中濕身目黃加茵陳水結胸加燈心木通○凡瀉赤入正散之類皆自此二方而變化之也</sup>

和解<sup>和其內熱解其外邪</sup>傷寒方之王道也

小柴胡湯<sup>又名三禁湯禁發汗利大小便者宜此本治少陽半表裏症頭痛項強耳前後腫或驚筋脉拘</sup>

急身疼脇痛寒熱往來或嘔或渴或咳或悸胃脘痞滿煩悶硬痛或汗下前後不解及瘟疫兩感太陽陽明初症不敢汗吐與下過經不解熱入血室等症雜病蒸熱肌體羸瘦為用最多但其間有五症尤為的當傷寒五六日胃滿心煩喜嘔身熱心中咳逆不欲食或嘔或不嘔者一二服若因渴欲飲水者不可服寒熱往來而心



悸者二可服脇下滿硬而痛耳聾腎瘕小便不利或渴或不渴者三可服發潮熱者四可服瘥後發熱者五可服要知無熱症者不可服為藥性頗寒耳

柴胡

錢三

黃芩

錢二

人參

錢一

半夏

錢一

甘草

四分

姜三片棗二

溫服則能入膽此方內有柴胡半夏能利能汗以解半表裏之邪然本氣分藥也而血病每用之者以柴芩專能調血故也此傷寒日晡不眠者熱必傷血故表惡寒發熱而裏未實者加桂以溫血表熱而裏又燥渴糞硬者加大黃以清血胃中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌仁渴者去半夏加入參瓜蒌根腹痛去芩加芍藥脇下痞悶去棗加牡蠣枳實脇痛加青皮未經下而心中飽悶加枳實心胃小使不利去芩加茯苓不渴外有微熱去參加桂枝咳嗽去參棗加五味子炮乾姜嘔加姜汁竹茹虛煩加竹葉粳米鼻衄加生地茅花痰盛或喘加桑白皮烏梅熱盛錯語不眠加山梔黃連黃柏少陽陽明合病口燥目疼加芍藥乾葛葛根加鱉甲過經不解



肺熱已而微利加芒硝自汗惡熱語煩渴去半夏合  
 白虎湯自汗惡風腹痛或寒多熱少脉弱去芍合桂枝  
 湯血虛發熱合四物湯去芍加麥門冬活草口燥去  
 半夏加天花粉或貝母齒燥血津液加石羔脉弦重無  
 力先因房勞憂遺感寒或病後血氣未固以致咳嗽吐  
 痰晝輕夜重發熱不止合四物湯去芍加麥門冬知母  
 黃柏脉弦虛無力或浮散發熱煩躁口渴不飲水此為  
 虛熱去半夏黃芩合生脉散熱入血室小腹痛晝明夜  
 昏妄見或寒熱不定似瘧合四物湯加牡丹皮男  
 子熱入血室加生地婦人熱入血室加當歸紅花

**陶氏小柴胡湯**  
 即小柴胡湯加陳皮芍藥川芎臨熱  
 入生艾汁三匙調服治法加減亦同

**和解散**  
 尋常感冒用此等分柴胡二錢黃芩八分參半夏其  
 草各一錢姜三片棗二枚水煎服如嘔逆倍生薑

加陳皮頭痛加羌活防風寒熱間作加桂枝中暑發熱  
 頭痛加黃連春溫時行加生地升麻溫瘡加常山檳榔

**火邪湯**  
 即小柴胡湯加黑豆一  
 撮煎服治火邪諸症



大柴胡湯

專治少陽病或因發汗利小便轉屬陽明此為少陽陽明蓋少陽變症陽明故以小柴胡變為大

柴胡治裏症內熱目不了了睛不和口渴煩躁黃斑狂妄譫語大便堅閉小便赤澀繞臍刺痛脉洪數沈實身熱不惡寒反惡熱及老人素虛或過經不解熱未除或下後仍發潮熱或腹中餘垢欠淨胃中脹滿而潮者最穩若身體疼痛是表未解不可服之柴胡三錢黃芩芍藥枳實各一錢半夏一錢半大黃三錢壯實者倍之若弱者減之姜三片棗二枚水煎服入大黃煎二三沸溫服取通快則止未利再服經曰熱淫於內以苦發之柴胡之苦以發傳經之熱裏不足者以甘緩之參草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆而嘔半夏之辛以散之邪半在表則榮衛爭為寒熱姜棗之辛甘以和之此小柴胡治半表裏症也經曰酸苦湧泄為陰是以大柴胡湯用枳芍之酸大黃之苦以泄上滿除中熱去參草之甘者恐滿中也仍用柴胡半夏姜棗者邪未全入於裏也○加減法昏亂譫語加黃連山梔痞滿加枳梗厚朴舌胎黃赤口渴渴飲水加瓜蒌仁夏月熱病煩



躁脉洪大加知母麥門冬石羔發斑加生地牡丹皮玄  
參發黃加茵陳黃柏鼻衄加犀角大便不通加芒硝

# 白虎湯

白虎西方之神應秋而歸於肺故夏近秋令中暑  
煩渴妙藥主治傷寒汗後脉洪大而渴中外俱熱

未全入裏宜此和解或吐下後邪未除熱結在裏心胃  
煩渴甚欲飲水自汗不惡寒反惡熱太便不閉及三陽  
合病頭痛面垢語遺尿身重難以轉側一切時氣瘟  
疫雜病胃熱咳嗽發斑及小兒瘡痘癰疹伏熱等症

知母二石羔

五錢熱甚七錢

甘草

六錢

粳米

小半合水煎溫服方

滑為在裏表有熱裏有寒宜知母石羔之苦甘以解內  
外之邪熱熱則傷氣宜粳米甘草之甘緩以益氣經曰  
熱盛所勝佐以苦甘是也或問白虎性寒熱病裏虛誤  
服多成結胃夏月陰盛體薄忌之百問云太陽病汗後  
脉洪大者宜此云裏寒者傷寒邪未入府言寒已入府  
言熱非寒冷之寒與瓜蒂散客寒上焦何同如虛煩甚  
加麥門冬裏熱大渴煩躁表熱微惡寒脉浮並加人參  
尺寸俱長而疾自汗大出身表如水乃陽明傳少陰宜



加桂枝 惡煩證語小便  
淋瀝起卧不安加山梔

# 陶氏白虎湯

即白虎湯加入參麥門冬五味子山梔姜棗  
竹葉煎服治法同上如心煩加竹茹太渴心

煩皆惡寒去山梔加天花粉○凡黃芩湯解毒湯麥門  
冬湯一切平和清解之劑皆自此三方而變化之也○  
抑論無汗煩躁而脉浮緊者可服青龍無汗喜渴而脉  
單浮者勿投白虎陽明白汗引飲則五苓散未可輕進  
太陽自汗惡寒則桂枝湯不可妄與其故何哉蓋人身  
以氣液為主在外則為正汗以養皮毛而不燥在內則  
為津液以和胃口而不渴在下則為小便而不澀是以  
三者恒宜相固而不相傷也小便數則津下流矣豈宜  
桂枝重發其汗陽明汗多津外泄矣豈宜五苓復內滲  
其小便白虎之名義甚可畏者性甚寒涼無汗脉浮表  
未全解猶宜柴胡解肌之藥豈可純以裏寒藥治之耶  
無汗而不煩躁者麻黃湯有汗而煩躁者桂枝湯惟無  
汗而煩躁者而後可青龍湯以加石膏性緩對麻黃而  
言故有是善名也噫用之當者朝大黃暮附子不為憐



也。用之不當，小柴雖稍平和，亦貽害也。用藥者，可不知古人立方之意乎？

### 陰症

#### 溫補

溫其中，補其虛。素體虛寒，及汗吐下後，暴虛寒者，用之。中病即止。

#### 理中湯

治太陰腹痛，自利不渴，脈沉無力，手足或溫或冷，及蛔厥霍亂等症。

人參 白朮 乾姜 各二錢

甘草

一錢半 水煎溫服，如作丸以煎三味俱用五錢，甘草三錢。

為末，蜜丸，彈子大，每一丸白湯化下。大便澀者，用九利者，用湯方意以乾姜之辛溫胃散寒，參朮甘草之甘緩脾氣，調中經曰：脾欲緩急食甘以緩之。又曰：寒淫於內，平以辛熱是也。如寒甚腹痛拘急，四肢逆冷，加附子。膈下動氣欲作奔豚，去朮加肉桂。吐多去朮加生姜。下多還用朮。悸者加茯苓。渴者倍白朮。腹痛裏虛倍人參。寒者倍乾姜。胃虛則氣壅腹滿，去朮加附子。嘔吐不止，減甘草加姜汁。吐蛔去甘草加烏梅。飢逆加丁香柿蒂。噎



逆加木香霍亂轉筋加石羔寒濕發黃加茵陳肺弱泄  
不止瀉不利倍參朮合五苓散內虛腹痛合小建中湯

陶氏理中湯

即前方加肉桂陳皮茯苓姜棗煎臨服入炒

渴氣上衝心饑不欲食食即吐胸腹痛便實加大黃蜜  
少許利之腹瀉滿時裁者去甘草嘔吐加半夏姜汁踏  
臥沈重利不止及利後身體痛加

附子自利腹痛加木香磨姜汁

治中湯

治太陰傷寒手足溫自利不渴咽乾腹痛痞悶時  
痛脉沈細及食積頭痛發熱惡寒身體不痛等症

即理中湯加青皮  
陳皮等分水煎服

小建中湯

治傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛有汗及  
少陰惡寒手足踈而溫凡傷寒初起及過經當

汗吐下尺脉遲者宜先服此又治傷寒  
二三白心忪而煩及諸汗不止等症

白芍

五錢

肉桂

三錢

甘草

二錢

飴糖

半斤

盛姜五片

棗四枚

水煎

如



便溏或嘔者去飴糖經曰建中者建脾也脾欲緩急食  
甘以緩之飴棗甘草之甘以緩中辛潤散也榮衛不足  
潤而散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收泄也正氣虛  
弱收而行之芍藥之酸以收正氣慄者氣虛也煩者血  
虛也以氣血內虛與  
小建中湯先建其裏

### 玄武湯

見賦三白湯人參三白湯辛黃三白湯凡方  
中以三白為王者皆自此方而變化之也

### 四逆湯

治直中陰症初病無頭疼無身熱無渴怕寒振慄  
蹇卧沈重欲寐脉來沈遲無方或無及太陰腹痛

自利不渴手足厥冷指甲唇青嘔吐涎沫或少陰下利  
清穀或咳或悸裏寒外熱脉微欲絕發躁身反不惡寒  
面赤腹痛或乾嘔咽痛或嘔吐飢逆或利止脉不出者  
此為陰甚於內格陽於外不相通也急宜此湯散陰通  
陽又傷寒表症誤下自利不止或表症未除而下利不  
止急宜此湯救裏凡三陰脉遲身痛並用陰毒要藥也  
乾姜五附子生二甘草  
錢半  
附相合辛甘大熱之劑散陰復



陽經日寒淫於內治以甘熱又日寒淫所勝平以辛熱是也如利止脉不出加入參無脉加猪膽汁面赤加連鬚葱白腹痛加芍藥陰毒心硬股冷加麝香皂莢少許

### 陶氏四逆湯

即四逆湯加入參白朮茯苓陳皮半夏肉桂五味子芍藥煎熟入麝三釐調服中病手足

溫和即止治法同上如嘔吐涎沫或小腹痛加鹽炒吳萸嘔吐不止加姜汁瀉不止加升麻黃芪咽痛加桔梗

### 當歸四逆湯

治厥陰病氣弱手足厥逆小腹疼痛或嘔噦或囊縮血虛則脉細欲絕亦陰毒要藥也當

歸芍藥各二錢肉桂一錢半細辛通草甘草各一錢姜五片棗二枚水煎溫服經曰脉者血之府也諸血皆屬於心通脉者必先補心益血若先入心當歸之苦以助心血心苦緩急食其以緩之通草甘草之甘以緩陰血如素有寒氣加吳萸倍生薑寒甚加附子脉不至加入參

### 三味參黃湯

治厥陰病乾嘔吐涎頭痛甚極及少陰吐利手足逆冷煩躁發死陽明食穀欲嘔得湯反



劇屬上焦寒等症尤妙吳萸三錢人參二錢生薑四錢  
棗二枚水煎溫服經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛  
吳萸生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以煖脾如陰逆  
厥冷唇青面黑舌卷外縮加附子細辛○十全大補湯  
十四味建中湯一切峻補之劑皆自  
理中建中四逆等湯而變化之也

### 炙甘草湯

治傷寒脈代  
結心動悸

甘草 三錢

人參 二錢

生地 桂枝 麻仁 麥門冬

各二錢

阿膠 二錢

半錢

姜三片棗二枚酒七分水分水一盞二分煎至二分服方意  
以脉代結者血氣虛弱不能相續也心動悸者真氣虛  
也是用參草大棗之甘以補不足桂姜之辛以益正氣  
本草云補可去弱是也麻仁阿膠生地門冬之甘以潤  
經益血復脉通心經曰津耗散則為枯五臟痿當榮衛  
澀溫劑所以潤之也○單甘草湯滋陰降火湯補陰丸  
生脉散補中益氣湯一切滋補  
之劑皆自此方而變化之也

傷寒終



東垣李先生內傷纂要

內傷

饑飽勞役  
飲食積聚

內外傷辨

人身以胃氣為主凡言陽氣元氣穀氣榮氣清氣衛氣春  
 升之氣皆胃氣之別名耳脾胃一傷中氣不足穀氣不能  
 上行以滋養心肺乃下流而乘肝腎痿厥氣逆腎受脾濕  
 閉塞其下致腎間陰火上衝心肺心肺者天之氣是無形  
 之氣受病故飲食勞役失節為內傷不足之症肝腎者地  
 之氣是有形之質受病故風寒邪侵筋骨風傷肝筋  
寒傷腎骨為外



傷有餘之症

經曰天之邪氣感則害人五臟水穀寒熱感則害人六腑又曰犯賊風虛邪者陽受之飲

食不節起居

不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟兩說相反而實不反也蓋內外之傷臟腑皆當受

之但隨其所從所發之處而為病耳

經曰東風入肝西風入肺南心北腎西南則舍於脾觀此則天之邪氣固傷五

臟矣然虛邪中人

人從皮膚而入絡脉而經而輸伏衝之脉以至於腸胃又曰東北角傷人內舍於大腸西北舍於小

腸東南舍於胃

則天之邪氣又豈不傷六腑乎經曰飲食自倍腸胃乃傷則水穀寒熱固傷六腑矣又曰形寒飲冷

傷肺飲食勞倦傷脾

亦未嘗不傷五臟也至於地濕亦未必專害皮肉筋脉而不能害臟腑邪氣水穀亦未必專害

臟腑而不能害皮肉筋脉也

但以邪氣無形臟主藏精氣故以類相從而多傷臟水穀有形腑主傳化物故因其所

由而多傷腑

濕氣浸潤其性緩慢故從下而上從淺而深而多傷於皮肉筋脉耳孰謂濕氣全無及於臟腑之理哉

觀此則知傷寒溫暑內傷雜病陰陽虛實之理

一而已矣仲景東垣丹溪河澗又豈有優劣哉有餘者瀉



不足者補補瀉一差生死立判其所以疑而似者為百病

皆起於惡寒惡風發熱頭疼等症雜病亦有六經所見之症外科亦然所以世俗

混而其最易辨者傷寒惡寒猛火不除內傷惡寒元氣下流心肺

無所稟受皮膚間無陽以護但見風寒使惡非常常有之無間斷也稍就溫煖即止傷風惡

風不耐一切風寒內傷惡風偏惡些小賊風避居密室外則不惡矣

傷惡熱無有休歇日晡劇烈直待汗下方退內傷發熱亦

似傷寒及中喝之症但煩躁時止時作或自袒裸亦便清

涼凡體弱食少過勞及常齋胃薄之人因勞役得疾皆與陽明中喝相似誤服白虎必死但中喝日晡熱甚或作

謔語內傷日晡病減為陽明氣旺故耳外傷筋骨疼痛不自支持便着床枕



內傷倦怠有似傷寒及中濕之症但四肢不收無力嗜卧

而已間有脾寒熱乘則骨消筋緩亦非得病即顯是症內

傷寒熱間作而不齊或因口吸風寒之氣其陰火使咽

衝脉之火所拒使陰氣不得入其胃中之氣為外風寒所

遏而不得伸令人口開眼瞤極則聲發於內氣不能上下

寒於咽中而氣欲絕又或因噦因嘔因吐而燥熱發必有

所因方有此症其表虛惡風寒之症復見矢表虛之弱為

陰火所乘燥發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣

是表虛無陽常常有之其燥熱則間而有之此二者不齊

燥作寒已寒作燥已非如外傷寒熱齊作而不間內傷

傷之寒熱齊作無有間斷也

頭痛時止時作外傷頭痛非發散直傳入裏方罷然豈特

初症似太陽可辨哉內傷則元氣不足神思昏怠語言倦



懶先重而後輕外傷則邪氣有餘神思猛壯語言強健先  
輕而後重內傷則手心熱而手背不熱外傷則手背熱而  
手心不熱內傷邪在血脉中有餘則不渴間有渴者心火  
尅肺乃傷之重  
也者外傷邪氣傳裏則大渴內傷症顯在口雖食亦不知味  
多唾涎沫鼻息不調或有清涕外傷症顯在鼻傷寒鼻塞  
傷風流涕雖不能食而亦知味內傷氣口脉大外傷人迎  
浮緊外感風寒則人迎脉緩或緊而大於氣口一倍或兩  
三倍內傷飲食則氣口脉大於人迎一倍傷之重者  
過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若勞役  
過甚心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢  
亦來薄肺故氣口脉急大而數時一代而澁也澁者肺之  
本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉



刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟  
右關脉數而獨大於五脉數中顯緩時一代也如飲食不  
節寒暑失所則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯  
脾脉之太數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而  
滑若顯內症多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先  
若顯外症多者則是外感重而內傷輕宜以發散為急此  
醫之大關鍵也奈何業者不學妄行凡病莫分內外專以  
發散為先實實虛虛可勝嘆哉

內傷辨 新纂

內傷勞倦飲食之症固與風寒暑濕之病不同矣然勞倦  
傷與飲食傷又豈無可辨者哉以勞倦言入經云陰虛生



內熱又云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘  
不通胃氣熱薰胃中故內熱此內傷之原也然人身陰陽  
有以表裏言者有以上下之分言者有以升降呼吸之氣  
言者此所謂陰虛之陰蓋勞過則氣化為火水穀之味因  
而少入是故陽愈盛陰愈衰也  
蓋指身中之陰氣與水穀之味耳夫勞倦飲食損傷氣分  
既有陰氣陽氣之分則  
思慮色欲損傷血分又豈無有陰血陽血之異乎以此見  
血陰氣陽者分陰分陽之義也氣血各自有陰陽者陰陽  
互為其根之理也太法陽氣虛者宜桂附兼參附峻補陰  
氣虛者參朮甘草緩而益之陰分血虛者生地玄參龜板  
知母黃柏補之陽分血虛者茯苓參歸遠志或以下焦陰  
之類補之論至於此東垣丹溪之功大矣哉  
分為言或以腎水真陰為言皆非也夫有所勞倦者過動



屬火也形氣衰少者壯火食氣也穀氣不盛者勞傷元氣  
則少食而氣衰也上焦不行者清陽不升也下脘不通者  
濁陰不降也夫胃受水穀惟陽升陰降而後變化出入以  
滋榮一身今胃不善納而氣衰少則清無升濁無降矣故  
曰上焦不行下脘不通然非謂絕不行不通也但比之平  
人則謂之不行不通耳上不行下不通則鬱矣鬱則少火  
皆成壯火而胃居上焦下脘兩者之間故胃氣熱熱則上  
炎故薰膈中而為內熱也內傷始病熱中未傳寒中陰盛  
生寒中多因調治差誤或妄下  
之所致遇寒則四肢厥冷心胃絞痛冷汗自出  
乃腎之脾胃虛也宜辛熱溫藥理中下二焦勞則氣衰



氣短喘且汗出内外皆越故氣耗矣氣耗則火旺火旺則

乘其脾土脾主四肢煩熱無力懶於語言動作喘乏表熱

或表虛惡寒心煩不眠勞役初病少食小便赤黃太便或

有下氣或泄瀉或黃如糜苦心下痞塞或加胃脘當心而

痛如刀割之狀有時上支兩脇痛必臍下相火上行使陽

明經氣逆胃中甚則高喘但病每互出不併作與外感異耳宜安心靜養心之意即真

則脾以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中

勞矣平人脈大為勞脈極虛亦

經言勞者溫之損者益之是也為勞夫勞之為病其脈浮

大手足煩熱春夏劇秋冬差脈大者熱邪也極虛者氣損

也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也以建中補中

治之亦溫之之意也經

日溫能除大熱是也雖然勞倦亦有二焉勞力純乎傷



氣而無汗者補中益氣之旨也

夫脾胃虛者因飲食勞倦

次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經曰急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰膝間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脉之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胃中為清濁相干用陳皮以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也脾胃氣虛不能升浮為陰傷其生發之氣榮血大虧營氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸前熬氣血日減心主血血減則心無所養致使心亂而煩病各曰悅悅者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽旺則能生陰血更以當歸和之傷之重者一日進進二服得陰陽和而汗自出病可已矣然非發散之謂也

勞心兼傷乎血而有汗者黃



建中之義心力俱勞氣血俱傷者雙和散之所由名也

凡諸益氣湯保元湯之類皆自補中建中而推之也凡歸脾湯養心湯及節齋新立二方之類皆自雙和而推之也

又勞傷腎症與勞倦相似均上內傷發熱症也勞倦因陽氣之下陷宜補其氣以升

提之房勞因陽火之上升宜滋其陰以中下之一升一降迥然不同矣謹發熱七情動氣脉與飲

食無二蓋飲食七情俱能閉塞三焦薰蒸肺胃清道肺為氣主由是而失其宣化之常所以氣口獨緊且盛

其症嘔泄痞滿腹痛亦六相似但傷食惡惡俱不可不細辨良七情雖作飽亦不惡食臨時消息問察

之茲述其略尚當於各類融會而貫通之可也以飲食傷

者言之經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脉橫解則腸

痺為痔蓋飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下



分消其濕解醒湯五苓散之類是也

酒之氣未俱陽苦以大熱太寒之藥下之

是無形之氣受傷而反下有形陰血夜瀉其水陽毒太旺愈增陰火循上元氣消亡七神何依雖不即死而虛損之病成矣所以酒疸不許下下之久久成黑疸蓋以此也

食若有形之物傷之則宜損

其穀其次莫若消導丁香爛飯丸枳朮丸之類主之稍重

則攻化三稜消積丸木香見曉丸之類主之尤重者則或

吐或下瓜蒂散備急丸之類主之此大法也條分縷析其

間有失饑傷飽而無停滯者或飲食不調之後加之勞力

或勞力過度之後繼以不調皆謂之不足而當補益者也

有自己喜食或與人鬪食而停滯者此為有餘而當消導



者也。又有傷生冷硬物者，有傷辛辣熱物者，或熱物多而寒物少，或寒物多而熱物少，或先食熱物而後食冷物，以致前食熱物亦不消化，所傷之不同如此。安可以執一乎？况人之氣稟盛衰每每相反，有物滯氣傷，必補益消導兼行。若有物暫滯而氣不甚傷，宜消導獨行，不須補益者，有既停滯而復自化，不須消導，但當補益，或亦不須補益者，潔古東垣枳木丸之類。雖曰消導，固有補益之意存乎其間。方以白朮、甘草、溫補脾之元氣，苦味除胃中之濕熱，利腰膝間血，故先補脾胃之弱，過於枳實、梔化之藥一倍，枳實味苦寒，泄心下之痞悶，消化胃中所傷。此藥下胃，其所傷不能即去，須待一兩時辰許，則消化是先補其



虛而後化其所傷則不峻利矣荷葉中空象震震者動也  
人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蒂也內經  
云立端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽  
甲膽之氣也其手少陽三焦經之司胃氣穀氣元氣甲膽  
上升之氣一也荷葉空青而象風木食藥感此氣之化胃  
氣何由不上升乎更以燒飯和藥與白木協力滋養令胃  
厚耳不至內傷若傷熱用丁香香巴豆熱藥傷冷用大黃牽  
牛寒藥不但遺留藥毒重瀉元氣又且飲食傷中傷而反  
瀉上焦清氣暗損人壽不得終其天年但人不自覺耳  
其他如木香分氣丸導氣枳

實丸大枳壳丸之類雖無補益然施之於物暫滯氣不甚  
傷者豈不可哉但不宜視為通行之藥爾且所滯之物非  
枳木丸之力所能去者亦安可泥於消導而弗之變乎故  
備急丸瓜蒂散等之推逐者亦未嘗去之而弗用也故善



用兵者攻亦當守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其  
敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推  
逐之理矣吁均一內傷也勞倦不足一而已矣飲食有有  
餘不足之分焉誤用補益則甘溫助濕生痰變生嘔瀉脹  
滿危症誤用推逐重傷元氣脫下而死利害匪輕如此故  
妄綴之爲內傷辨

脾胃虛實傳變論

經曰胃大腸小腸三焦膀胱五者天氣之所生也其氣衰  
天故瀉而不藏九竅者五臟之所主然必得胃氣乃能通



利胃氣一虛口目耳鼻俱為之病其身熱頭痛耳鳴目眩  
沈重為熱所傷元氣故也陽氣最惡煩勞順之則固惟脾  
胃和則穀氣上升為春夏令行而人壽脾胃不和則穀氣  
下流為收藏令行而人失凡十一臟皆取決於膽膽氣升  
則餘臟從之膽氣不升則餐泄腸澼天食人以五氣地食  
人以五味味藏於胃以養五氣或乖錯形何以存故諸  
病從脾胃而生明矣姑以勝衰者言之胃中元氣盛則能  
食不傷過時不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不  
能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾實而邪氣



盛也。又有善食而瘦者，胃伏火邪於氣分，則能食脾虛則肌肉削。故面熱者，胃病也。胃病則脾無所稟受，故亦從而病焉。脾病則下流乘腎水，土尅水，令人骨髓空虛，乏力不足，不能履地。是陰氣重疊，陰盛陽虛，汗之則愈，下之則死。然非正發汗也。用辛甘之藥，滋胃當升，當浮使生長之氣旺以助陽耳。夫胃病其脈緩，脾病其脈遲，若火乘土位，其脈洪緩更有身熱，心中不快之症。此陽氣衰弱，當從升降浮沈補瀉法中用藥。詳後用藥法象蓋治病不達升降浮沈之理雖愈亦幸耳昔有病脾胃久衰視聽半失淫雨陰寒踰月不止泄利體重肢節痛太便秘下小便閉若用淡滲之劑病雖即已降之又降是益其陰而重竭其陽



精神愈短故必用升陽藥以活獨活柴胡升麻各一錢  
防風甘草五分水煎稍熱服陽氣升騰而疾去矣又有脾  
胃虛損目疾肝作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不  
調食少氣短怠惰醫以瀉肝散下數行而前疾愈其適當  
暑雨素有黃症所以增劇也因立清神益氣湯治之茯苓  
升麻各二分澤瀉蒼朮防風各三分生薑四分此數藥能  
走經除濕熱而不守故不瀉脾肺與脾胃本中氣之虛  
弱青皮一分生甘草白朮各二分人參五分此數藥  
能守而不走經者不滋經絡中之邪守者能補  
臟之元氣黃耆一分麥門冬人參各二分五味子三分此  
藥去時令浮熱濕熱水煎空心如脈緩病怠惰嗜卧四肢  
熱服而愈舉此二者以為症佐

不收或大便泄瀉此濕勝也從平胃散若脈弦氣弱自汗

四肢發熱泄瀉毛枯髮落從黃芪建中湯苟脈緩而用建中脈弦而用平

胃則脈虛血弱摘四物湯一二味脈弱氣短摘四君子湯



一二味或小使赤黃從五苓散去桂枝一二味俱以水症  
中加之如妨悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之中  
焦用芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯如腹中窄狹  
及縮急者去之及諸澁酸藥亦不可用腹痛者加甘草白  
芍藥穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此  
仲景之妙也五苓散治渴而小便不利無惡寒者不可用  
桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血症用炒黃柏知母  
心臟熱而竅不利者導赤散或虛坐而太便不得者皆血  
虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身



調理脾胃於此五藥中加減無不應驗然終不能使人完

復內傷以脾胃虛敗為甚酒色之凡重損脾胃盛者易復脾胃弱者只可半愈故農耕終歲勞苦而不成傷能

納能化脾胃盛耳後或有因而再至者亦由督任衝三脉陰氣邪

胃氣虛弱之所致也法須依症加減如熱方療病非素問

之旨也經云至而不至是為不及所勝妄行所生受病所

不勝乘之也至而不至者謂從後來者為虛邪心與小腸

乘脾胃也脈見浮大而弦病或四肢煩燥口苦舌乾咽乾

蓋心主火小腸主熱火熱乘土濕熱相合故煩燥悶亂口

肢脾胃之末也火乘之故發熱飲食勞役所傷以致脾胃



虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾也神乃

真氣之別名今七神離形而脉中惟有火矣善治斯疾惟使心無凝滯人或逢喜事或天氣暄和或食滋味或眼前

見可愛事則慧然無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也忌用五苓散亡津宜補其母於

心與小腸中以補脾胃之根蒂甘溫白蜜主苦寒黃連為使

酸味芍藥為之臣佐以其心苦緩急食酸以收之此治心火不能生土

是為火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫甘寒

辛連知柏之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也火盛

生地之類垂脾亦為不及心火者陰火也起於下焦其絡系於心心

不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負如脉見洪大而煩渴氣喘是火大旺而氣大衰也陰火說自東垣乃發素問之未發者也



所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也木旺則挾  
火而妄行故脾胃先受之或身體沉重或手足麻木蓋濕熱  
相搏風熱鬱不得伸附著于有形也或多怒者風熱下陷  
於地中也或目病內障肝主血開竅於目也或妄見妄聞  
起妄心夜夢亡人或寒熱往來或四肢滿閉或淋瀝便難  
轉筋皆肝木火盛而為邪也或生癢或生痺或生厥或中  
風或生惡瘡或作腎痿或上熱下寒皆風熱不得升長而  
木火過於有形中也

宜柴胡為君防風赤芍甘草桂枝為臣  
猪苓澤瀉茯苓蒼朮知母黃柏滑

石石羔羌活獨活川芎細辛蔓荊子為佐升麻為使經云  
惟有陽明厥陰不從標本從乎中中乃不定之辭非中外



之中也蓋厥陰為十二經之領袖主生化陰陽足陽明為  
十二經之海主經營氣血諸經皆稟之言陽明厥陰與何  
經相併而為病中以用藥所以言此者發明脾胃之病  
不可二刻而推欲人知百病皆由脾胃而生也釐毫之失  
災病立生假如時在長夏於長夏之令中立方謂正當主  
氣衰而客氣旺之時也後之更方者當從此法加時令藥  
加長夏則補脾胃濕陰火升陽湯是也大抵此法此藥  
陽氣升浮耳大禁參杜滋陽之味亦有從權而用黃柏  
知五為督任衡三時盛也所生受病者由土弱不能生金反受火木之  
邪而清肅之氣傷或胃滿少氣短氣氣上精神少而倦惰  
慘慘常不樂皆陽氣不足而陰有餘也或咳嗽寒熱者濕  
熱乘其內也脾不健化鬱而為痰變生咳嗽暈等症治  
法氣柔白皮甘草水香檳榔五味子為佐桂枝梗為引用所不勝乘之者水乘木之



妄行而反來侮土故腎入心為汗入肝為泣入脾為涎入

肺為痰為嗽為涕為嚏為水出鼻自入則為溺多為惡寒

也宜乾姜為君白朮附子肉桂為臣茯苓猪苓澤瀉為佐使一說下元土盛尅水致

督任衝三脉盛火旺煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰唾出

於口也下行為陰汗為外腎冷為足不任地為腰脊背脚

脚下隱痛或水附木勢而上為眼澁為眵為冷淚此皆肺

金之虛而寡於畏也夫脾胃不足皆為血病故九竅不通

諸陽氣根於陰血陰受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而

陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者也陰氣



附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也  
今所立方中有辛甘溫藥者非獨用也復有甘苦大寒之  
劑亦非獨用也以火酒二製爲之使引苦甘寒藥至頂而  
復入於腎肝之下此所謂升降浮沉之道自偶而奇奇而  
至偶者也陽分奇陰分偶濕陰火以諸風藥升發陽氣以  
滋肝膽之用是令陽氣生上出於陰分未用辛  
甘溫藥按其升藥使不發散於陽分而令走於九竅也○  
升降浮沉說天以陽生陰長地以陽殺陰藏天氣旺於寅  
寅者引也立春少陽之氣始於泉下引陰升而在天草木  
甲拆立夏少陰火熾草木盛茂此謂天以陽生陰長經言  
歲半以前天氣主之在乎升浮也地氣旺於申立秋太陰  
之氣始得大伸自天而下降微地則品物咸殖立冬少陰  
之氣伏於泉下水冰地拆此所謂地以陽殺陰藏經言  
半以後地氣主之在乎降沉也春溫夏暑秋涼冬冷正氣



之序升已而降降已而升如環無端運化萬物故曰履端  
於始序則不愆人之呼吸升降殺象天地飲食入胃氣先  
歸脾肺上行春夏之令以滋養周身乃清氣為天者也升  
已而下輸膀胱行秋冬之令為傳化糟粕乃濁陰為地者  
也損傷脾胃真氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而  
無春夏百病皆起又有久升而不降者亦病焉於此求之  
則履端之義明矣

經云食入于胃散精于肝淫氣於筋食入于胃  
濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸于肺肺朝百脉輸  
精於皮毛毛脉合精行氣於肺且飲食入胃先行陽道而  
陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者克塞頭頂則九竅  
通利也若飲食不節損其胃氣不能剋化散於肝歸於心  
溢於肺食入則胃欲卧則食在一邊氣暫得舒是



知升發之氣不行者此也經云飲入于胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺則心火上攻使口燥咽乾是陰氣太盛其理甚易知也况脾胃病則當臍有動氣按之牢若痛有是者乃脾胃虛無是則非也亦可作辨矣

內傷饑飽勞倦總方

補益

補中益氣湯

治形神勞役飲食失節虛損身熱而煩脉大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

兼治婦人室女經候不調血脫益氣之本法也



黃芪一錢勞後甚人參久嗽肺有甘草各一錢三味除

當歸和白朮助陳皮道氣又能同諸柴胡引少陽

升大除引胃氣右升而復其本位同柴胡須用酒

降之五件各五分益甚升柴只用二分汗多者全去之

參芪木有用至二兩一服者甘草有用二三錢一服者

水煎已未午初時溫服傷之重者連進二服如得微汗

即愈忌多言勞役靜養一二十時辰又方進美膳以助之

常服去升柴加黃柏二分以滋腎

水紅花二分入心養血多用破血

加味黃芪湯又名保元湯治陽虛皆惡寒即前方

升陽順氣湯治春月口淡無味夏月雖熱猶寒饑飽失常

結恐懼氣下等症即補中益氣湯

去白朮加黃柏草豆蔻神麴半夏



黃芪人參湯

治夏天氣熱精神不足兩脚痿軟煩熱嘔噦  
自汗頭痛痰嗽心脇腹痛胃中閉塞小便頻

數大便難而閉結皆熱傷肺之所致也宜常服之  
即補中益氣湯去柴胡加蒼朮神麴五味子黃柏

清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸入四肢困倦精神少懶於動  
作胃滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩

心下膨脹小便黃而數大便澀而頻或渴不思飲  
食自汗體重等症即補中益氣湯去柴胡用黃芪一錢

止汗除熱人參五分當歸甘草各三分補中益氣湯  
一錢白朮澤瀉各五分參利除濕升麻一錢乾薑二分

善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故  
炒神麴五分青皮二分陳皮五分以消食快氣腎惡燥

故以黃柏二分借其味濕熱補水虛者滋其化源以五  
味子九粒麥門冬三分救暑傷肺金中賜忌汗下溫針

升陽補胃湯

治長夏濕熱陽明少陽下血即補中益氣湯  
去陳皮加桂芍羌防乾葛獨活生地升麻

升陽益胃湯

治秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾  
飲食無味大便不調小便頻數食不消其見



肺病洒淅惡寒慄慄不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也黃芪二錢人參甘草各一錢白朮三分陳皮四分柴胡三分加羌活獨活防風各五分以秋旺故用辛溫渴乏白茯苓澤瀉各三分渴者勿用半夏一錢黃連一分白芍五分姜棗煎服後如小便罷而病加劇去茯苓澤瀉何故秋旺反用參朮芍藥之類補之脾胃虛則肺供受邪故因時而補易為力也若喜食不可飽食恐胃傷忌不可淡食以損藥力宜安靜少役形體使胃與藥得轉運升發胃氣稍強少食果物以助之經云五穀為養五果為助者也

### 神聖復氣湯

治氣虛冬足大陽寒氣足少陰腎水子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背

胃膈閉塞疼痛善噎口中涎目中泣鼻流濁涕不止或息肉不聞香臭欬嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中流火視物瞢瞢耳鳴耳聾頭併口鼻或惡風寒喜日陽夜卧不安常覺痰塞咽膈不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚙物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒痺麻木小便數而晝多夜頻欠氣短



喘作渴少氣不足以息遺矢無度婦人白帶陰戶中痛  
牽心而痛面如赭色食少太便不調煩心霍亂逆氣裏  
急而腹皮色白後出餘氣復不能努或腸鳴膝下筋急  
肩胛大痛此皆寒水木復火土之讐也乾姜炮三分半  
夏六分柴胡一錢藁本八分防風人參郁李仁各五分  
升麻七分附子二分當歸六分羌活一錢甘草八分白  
茯苓五朶去心水五鍾煎至二鍾入黃連黃柏酒洗枳殼生地  
各三分已上四味先一日水浸又以細辛二分川芎蔓  
荊子各三分先一日用水半鍾分作二處浸此三味并  
黃柏等煎正藥作一鍾不去渣入此浸藥并煎至一太  
鍾去渣空心稍熱服又治咬頰咬舌咬唇舌強等症宜  
食肉汁不宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎與膀胱  
經中有寒元氣不足者皆宜服之神效於月生月滿時  
隔三五日一服如  
急病不拘時分

# 沈香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和  
臟腑積冷心腹疼痛太便滑泄腹中雷鳴霍



亂吐瀉手足厥冷大便利無變又合下寒易虛齊腹令  
痛一切寒中及療傷寒陰濕形氣沈困自汗等症沈香  
甘草良姜當歸吳萸人參木香茯苓白朮芍藥各五錢  
附子巴戟乾姜茴香各一兩官桂七錢丁香二錢為末  
醋糊丸梧子大每五十丸空  
心熱米飲下忌一切生冷物

調理

參朮調中湯

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食即補中  
益氣湯去當歸升柴用黃芪四分人參其草

各三分陳皮二分白朮加桑白皮各五分瀉肺定喘五  
味子廿粒收桂散之氣以止嗽地骨皮二分善解肌熱  
茯苓三分以降肺火麥門冬二分  
以降肺氣青皮一分散習中滯氣

調中益氣湯

治脉弦洪緩而沈按之中得三澁其症四肢  
滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不  
安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或  
上飲下便或大便澁滯不行一日二白一見夏月強壯



米穀不化或便後見血見白膿留滯短氣咽膈不通安  
卧嗜睡無方不思飲食即補中益氣湯去木歸用黃芪

一錢人參甘草各五分升麻柴胡橘皮各  
二分加蒼朮四分木香一分水煎熱服

### 節齋補氣方

人遇勞倦辛苦用力過多即服一二服免生  
內傷發熱之病黃芪錢半人參白朮陳皮麥

門冬各一錢茯苓八分甘草七分五味子

廿粒姜棗煎服勞倦甚加熟附子四五分

### 節齋補血方

人遇勞心思慮傷損精神心虛氣短驚悸煩  
熱宜服人參一錢二分五味子十五粒當歸

麥門冬白芍茯苓酸棗仁生地各一錢山施

耳草陳皮各五分川芎四分空心姜棗煎服

### 雙和散

治心火俱勞氣血俱傷或房室之後勞役或勞役  
之後犯房大病後虛勞氣乏等症黃芪川芎當歸

熟地各一錢官桂甘草各七分半白芍二錢半姜棗煎

服以此調治但陰虛火動者宜善加減又黃芪當歸二

味亦名補血湯善治內傷發熱人參養榮湯黃芪建

中湯八物湯平胃散五苓散皆調理間用之劑也



硃砂安神丸

治勞神過度以致心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊憹狀或服升補藥後氣浮心

亂以此鎮之則愈方見卷三

升散外熱

升陽散火湯

治男婦四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱如

中此病多因血虛而得或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之此藥乃胃膽脾肺膀胱經藥也升麻

葛根獨活羌活白芍人參各五分防風二分半

柴胡八分炙甘草三分生甘草二分水煎服

升陽湯

治一日大便秘三四次澹而不多有時泄瀉腹中鳴小便黃柴胡益智仁當歸陳皮各三分升麻六分

甘草二錢黃芪三錢

紅花少許水煎熱服

火鬱湯

治手足心發熱升麻葛根柴胡白芍各錢半防風甘草各一錢葱白煎服



瀉陰火升陽湯

治肌熱煩熱而赤少食喘咳痰盛右關脉緩弱或弦或浮數羌活甘草黃芪蒼朮各

一錢升麻八分柴胡錢半人參黃芩各七分黃連酒炒石羔各五分深秋勿用水煎服按此發脾胃火邪之劑

又心膽肝肺膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也

分消 內濕

升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便便黃四肢困弱升麻柴胡防風神麴澤瀉

猪苓各五分蒼朮一錢陳皮甘草麥芽各二分黃連煎服如胃寒腸鳴加益智仁半夏非腸鳴不得用

升陽除濕防風湯

治大便秘塞或裏急後重數至周而不

反鬱結而不通以此舉其陽則陰氣自降矣如脾濕下流肝腎而成泄瀉者宜此補之升之舉之不可疎下若脉實腹脹閉塞不通從權以苦多甘少之藥泄之蒼朮四兩防風二錢白朮白茯苓各一錢用水二鍾半先



煎蒼朮至二鍾入諸藥  
再煎至一鍾空心熱服

婦人

升陽燥濕湯

治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮緩身重  
如山陰中如冰防風良姜乾姜郁李仁甘草

各一錢柴胡一錢三分陳皮黃芩各  
五分白葵花七朵分作三貼水煎服

升陽調經湯

治飲食勞倦暴崩不止或下水漿怠惰嗜卧  
四肢困倦及夏月帶下脫漏等症獨活五分

蔓荊子七分當歸防風甘草升麻藁本各一錢柴  
胡羌活蒼朮黃芪各錢半空心水煎服以飯壓之

升陽舉經湯

治經水不止如右尺按之空虚是氣血俱脫  
大寒之症雖輕手其脈數疾舉之弦緊或瀉

此是陽脫陰火亦亡或見熱症於口鼻眼或渴此皆陰  
燥陽欲先去也此方切補命門之下脫也肉桂盛夏勿  
用白芍紅花各五分細辛六分人參熟地川芎各一錢  
獨活黑附子甘草各錢半羌活藁本防風各二錢白朮



當歸黃芪柴胡各三錢桃仁  
十枚分作四貼空心水煎服

### 益胃升陽湯

治婦人經候不調或血脫或脉弱食少水泄  
日二三行即補中益氣湯加神麴錢半黃芪

五分腹痛加芍藥此方氣血  
之藥血脫益氣之要法也

### 升陽和中湯

治閉目則渾身麻木晝夜甚覺而開目則  
麻漸退乃陽衰陰旺非有風邪法當補肺瀉

陰火與濕通行經脉調和陰陽此藥主之生甘草大腎  
熱則黃柏白茯苓澤瀉俱除濕導火升麻行陽助經柴胡  
各一分半橘皮當歸白朮各二分白芍人參各三分  
佛耳草炙甘草各四分黃芪五分食遠水煎熱服

### 小兒

### 保元湯

治慢驚風令脾土實而木不敢犯又為疹痘給終  
必用之藥也黃芪錢半人參一錢甘草五分水煎

服加減  
見小兒



外科

補中益氣湯

乃癰疽托裏排膿扶脾  
胃之聖藥也加減由人

內傷耳鳴目黃頰頰腫頸肩膈肘臂外後廉痛面赤  
洪大者以羌活一錢防風藁本各七分甘草五分通其  
經血加黃芩黃連各三分消其腫人參五分黃芪七分  
益元氣而瀉火邪另作一服與之嗌痛頰腫脉洪大面  
赤加黃芩○內傷發熱者因胃氣壅甚是火遊行於外  
亦發熱所致火則補而降之熱則微瀉以散之切不可  
下恐生

危症

右補中益氣一方六經見症詳傷寒百病相兼見雜病  
春夏秋冬無不可通男女內外無所不治升而浮之羌  
獨荳防不為發散降而沉之木香檳榔猪澤知柏不為  
陳滲熱之乾姜肉桂甚則附子寒之芩連滑石甚則木  
黃藥者於此而一悟焉則處方用藥非惟善於加減變  
化而無疑滯亂雜之弊亦且關鍵可觀而有洞中懸刺



之妙然後謂之依東垣用藥亦即謂之効仲景處方蓋  
能依東垣則仲景在其中矣能効仲景則東垣亦在其  
中矣二公方藥俱自湯液而來理意同而品味多寡病  
不同耳且清暑益氣仲景法也枌葉東垣相似尤為詳  
驗以後雜病方中有言百般加減由人即此類是也其  
餘如頭痛加羌活活套則不甚錄即頭痛太陽川芎陽  
明白芷豈可驟加乎並哉諸益氣皆自補中而變或以  
補中益氣為主而加散邪之藥或以辛涼解散之藥為  
君而以參朮等藥為臣皆因時令主客互為勝衰內外  
感傷各有輕重而加減出入之也其實通治飲食勞後  
或無力動作懶於言語或飯後反倦或當春口淡或遇  
夏惡寒或值秋熱令稍退肺病酒淋恹恹不樂或發常  
如飽或便後見些膿血無非脾濕下流以致內熱變生  
諸病但初病熱中則可用之若未傳寒中則不可用也  
蓋甘酸適足以益其病耳如黃芪人參甘草芍藥五味  
子之類是也以此見諸升益之劑難用尤甚於桂枝麻  
黃湯也飲食傷成積聚  
者消導推逐尤宜慎重



內傷飲食積滯方

見雜病傷食積聚  
益氣湯加減見雜病藥賦

編註醫學入門外集卷之三

終

易吾

尹名萬育







